

لیتو خوارزمی پریتیفن® شربت کتوتیفن

موارد و مقدار مصرف:
دسته دارویی: آنتی هیستامین

رنیت آلزیک:

کودکان ۱۷-۳ سال: ۱ میلی گرم دو بار در روز.
بزرگسالان: ۱ میلی گرم دو بار در روز، در صورت نیاز می توان دوز را به ۲ میلی گرم دو بار در روز افزایش داد، همراه با غذا مصرف شود.

رنیت آلزیک در افرادی که به راحتی اثرات خواب آوری دارو را نشان می دهند:
بزرگسالان: در ابتدا ۱-۰/۵ میلی گرم یک بار در روز. دارو در شب مصرف شود.

موارد منع مصرف:

حساسیت به کتوتیفن یا هر یک از اجزای دارو در افراد با پورفیریا حاد

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بهتر است کتوتیفن در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود، مگر زیر نظر پزشک معالج.

هشدارها:

در افراد با بیماری های شدید کبدی به دلیل افزایش ریسک ابتلا به کما مصرف نشود.
بهتر است در کودکان زیر ۳ سال مصرف نشود.
در حین مصرف دارو از نوشیدن الکل و فرآورده های الکلی خودداری کنید.

احتیاط های مصرف:

کتوتیفن در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:
در افراد با سابقه صرع، هایپرتروفی پروستات (در بزرگسالان)، انسداد دستگاه گوارش، گلوکوم زاویه بسته، احتباس ادرار.

تداخل های دارویی:

داروهای خوراکی دیابت (متفورمین)، داروهای درمان اضطراب و بی خوابی، الکل، سایر آنتی هیستامین ها، باریتورات ها

عوارض جانبی:

تحریک پذیری (در بزرگسالان)، عصبی شدن، افزایش وزن، سندرم استیونس-جانسون، خواب آلودگی، شوک آنافیلاکسی، آتزیوادم، گلوکوم زاویه بسته (در بزرگسالان)، آریتمی، تاری دید، گیجی، تشنج، افسردگی، سرگیجه، خشکی دهان، سردرد، کاهش فشارخون، تپش قلب، لرزش بدن، واکنش های حساسیت به نور، راش های پوستی، احتباس ادرار، اختلالات خواب.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

اسفند ۱۳۹۷

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۴۰