

لیتو خوارزمی فلوید®

شربت سرماخوردگی کودکان

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: ضد احتقان و آنتی هیستامین
تسکین علائم احتقان بینی ناشی از
سرماخوردگی و علایم حساسیت
کودکان ۶-۲ سال: ۷/۵ میلی لیتر هر ۶-۴
ساعت.
کودکان ۱۲-۶ سال: ۱۵ میلی لیتر هر ۶-۴
ساعت.
کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۳۰ میلی
لیتر هر ۶-۴ ساعت.

موارد منع مصرف:

-حساسیت به دارو یا هر یک از اجزای آن.
-در صورت مصرف داروهای MAOIs (ترانیل
سیپرومین، فنلزین، ایزوگربوکسازید) و یا
داروهای پارکینسون (سلزین) در ۱۴ روز
گذشته در مورد مصرف این دارو با پزشک خود

مشورت نمایید.

-در صورت ابتلا به بیماری های آسم، گلوکوم
زاویه بسته، هیپرتروفی (بزرگ شدن)
پروستات، انسداد مثانه.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی دارو زیر نظر
پزشک معالج مصرف شود.

هشدارها:

-در طی مصرف این دارو، از نوشیدن الکل و
فرآورده های الکلی خودداری کنید.

موارد احتیاط:

-این دارو در بیماران با مشکلات قلبی-عروقی
با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی:

آمی تریپتیلین، کابرگولین،
دوکسپین، ارگوتامین،
ایمپرامین،

استازولامید، آلپرازولام، آریپیپرازول،
کلردیازپوکساید، کدئین، دیفنوکسیلات.

عوارض جانبی:

آریتمی، کاهش فشار خون، تپش قلب، گیجی،
تشنج، سرگیجه، سردرد، خواب آلودگی،
بی خوابی، لرزش بدن،
ضعف بدن، بی اشتها.

تاریخ آخرین بازرینی و تدوین:

اسفند ۱۳۹۷

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰