

قرص خوراکی روکشدار لورکستادین® ۵، حاوی ۵ میلی گرم دس لوراتادین می باشد.

دس لوراتادین ۵، در پلیسه های ۱۰ عددی، داخل جعبه به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی خوارزمی به بازار عرضه می شود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

دس لوراتادین از دسته آنتاگونیست های طولانی اثر و غیر خواب آور گیرنده هیستامینی H₁ می باشد، اثر آنتی هیستامینی دس لوراتادین بخصوص بر روی گیرنده های محیطی H₁ قوی و با عملکردی انتخابی تعریف شده است. مقدار مصرف قرص دس لوراتادین بسته به شرایط بیماری و بیمار جهت رفع علائم مربوط به رینیت آلرژیک فصلی و یا رینیت عودکننده (چندساله) مثل عطسه، آبریزش و خارش بینی، خارش چشم و ریزش اشک، هیمیتور جهت کاهش خارش، تعدد و اندازه کپیرهای پوستی مزمن با ریشه ناشناخته، مطابق نظر پزشک معالج تجویز می گردد.

مقدار مصرف عمومی:

رینیت آلرژیک (آلرژی مداوم یا منقطع):

- بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: روزانه یک عدد قرص یکبار در روز

کپیرهای پوستی مزمن با ریشه ناشناخته:

- بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: روزانه یک عدد قرص یکبار در روز

۳- نحوه مصرف:

- دوره درمان را کامل کنید و دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایید.

- از قطع یا تغییر در میزان مصرف و نحوه مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

۶- هشدارها:

- در صورت وجود نارسایی کلیوی شدید مصرف دارو با احتیاط همراه باشد.

- تا کنون گزارشی از مسمومیت با دس لوراتادین ثبت نشده است، در صورت مصرف بیش از حد به مراکز درمانی مراجعه شود.

۴- موارد منع مصرف:

- در صورت وجود حساسیت به دس لوراتادین یا به هر یک از مواد تشکیل دهنده آن یا حساسیت به لوراتادین.

۵- مصرف با بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود و مصرف آن تنها تحت نظر پزشک معالج امکان پذیر می باشد.

۷- موارد احتیاط:

- بعلمت احتمال ایجاد خطا در جواب آزمایش های پوستی از مصرف این دارو ۲۸ ساعت قبل از انجام تست های پوستی خودداری شود.

۸- تداخلات دارویی:

- طبق مطالعات بالینی و داروشناسی انجام گرفته بر روی مصرف همزمان دس لوراتادین با آزیترومایسین، اریترومیاسین، فلوکستین، سایمتیدین و کتوکنازول هیچ تداخل دارویی مرتبطی مشاهده نشده است، اگرچه بعلمت ناشناخته بودن آنزیم متابولیزه کننده دس لوراتادین، برخی تداخلات احتمالی این دارو با سایر داروها قابل اغماض نمیباشد.

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو با موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید: شایع ترین عوارض عبارتند از: تندی ضربان و تپش قلب، فاریت، خشکی دهان، درد عضلانی، خواب آلودگی.

عوارض نادر دس لوراتادین عبارتند از: واکنش آنافیلاکسی و راش پوستی، ادم و تنگی نفس، بیش فعالی روانی، صرع، افزایش سطح آنزیم های کبدی و افزایش سطح بیلی روبین و در حالات بسیار نادر تورم و التهاب کبد.

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مهر ۱۳۹۸



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پن بستم داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۷ - ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۸
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com