

لورکستادین® قرم متابولیت اولیه و فعال لوراتادین می باشد. این فراورده به شکل شربت دس لوراتادین ۱۲۰ میلی لیتری، حاوی ۲/۵ میلی گرم دس لوراتادین در ۵ میلی لیتر، که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و در جعبه، به همراه یک پیمانه مدرج و بروشور به بازار عرضه میشود.

#### ۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی

- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر

- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

#### ۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف شربت دس لوراتادین بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تجویز می گردد. جهت تسکین علائم آلرژی مانند رینیت آلرژیک (آبریزش بینی آلرژیک)، کهیر و کهیر مزمن ایدیوپاتیک (ناشناخته) تجویز می گردد.

#### مقدار مصرف عمومی:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

کودکان ۵-۱ سال: ۲/۵ میلی لیتر (۱/۲۵ میلی گرم) یک بار در روز.

کودکان ۱۱-۶ سال: ۵ میلی لیتر (۲/۵ میلی گرم) یک بار در روز.

کودکان ۱۷-۱۲ سال: ۱۰ میلی لیتر (۵ میلی گرم) یک بار در روز.

بزرگسالان: ۱۰ میلی لیتر (۵ میلی گرم) یک بار در روز.

#### ۳- نحوه مصرف:

- دوره درمان را کامل کنید و دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایید.

- از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف از دو برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید.

#### ۴- موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به دس لوراتادین و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو و یا لوراتادین

- اختلال عملکرد کبدی یا کلیوی

#### ۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی در ارتباط با منع مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی در دسترس نیست در این خصوص با پزشک خود مشورت کنید.

#### ۶- هشدارها:

وجود بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد.

لذا در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید.

- دس لوراتادین در بیماران با سابقه تشنج (بویژه در کودکان) لازم است با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

- احتیاس ادرار: این دارو ممکن است باعث وخامت احتباس ادراری گردد.

- پورفیری

#### ۷- موارد احتیاط:

۱- این دارو ممکن است در نتایج آزمونهای پوستی که برای تشخیص آلرژی انجام می گیرد، تأثیر بگذارد. بنابراین لازم است قبل از انجام هرگونه آزمون، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

۲- این دارو ممکن است علائم ناشی از مصرف مقادیر زیاد آسپرین مانند صدا کردن در گوشها را مخفی نماید.

۳- این دارو به اثرات الکلی، سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شامل مسکنها، آرامبخشها یا داروهای خواب آور، داروهای ضد درد با نسخه یا مخدرها، باریتوراتها، داروهای ضد تشنج، شل کننده های عضلانی، داروهای بیهوشی شامل بی حس کننده های دندان می افزاید. قبل از مصرف هر یک از داروهای فوق یا پزشک معالج خود مشورت نمایید.

- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

۵- این دارو کمتر باعث خشکی دهان، بینی و گلو می‌گردد. برای درمان موقت خشکی دهان می‌توان از آب‌نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه های یخ در دهان و یا جانشینی های بزاقت استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از دو هفته، پزشک یا دندانپزشک خود را مطلع نمایید. تداوم خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماری های دندان و لثه و عفونت های قارچی گردد.

#### ۸- تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید.  
- دماپروتیلین، اریترومایسین، فلوکونازول، ایتراکونازول، کتوکونازول، مترونیدازول، میکونازول، سایمتیدین، داروهای مهارکننده منو آمین اکسیداز (MAO) شامل ایزوکربوکسازید، فنلژین، پروکاربازین، سلجیلین و ترانیل سیپرومین

#### ۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

دس‌لوراتادین به عنوان آنتی‌هیستامین غیر خواب آور، اثرات خواب آوری کمتری را به همراه دارد و در صورت وجود خواب آلودگی، پس از مصرف چند روز دارو، عارضه از بین خواهد رفت. افراد سالمند و کودکان بیشتر در معرض عوارض جانبی این دارو می‌باشند:

**عوارض جانبی شایعی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:**

گیجی

**عوارض جانبی با احتمال وقوع کم و یا بسیار کم که نیاز به توجه پزشکی دارند:**

- تاری دید، خشکی دهان، اختلالات گوارشی، سردرد، احتباس ادراری، آریتمی، برونکواسپاسم، اختلال کبدی، درد عضلانی، راش، اختلال خواب

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار سریعاً به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه شود.

#### ۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می‌نماید.

**ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران**

**تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر ۱۳۹۸**



داروسازی خوارزمی  
**Kharazmi**  
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غفاری جلال،  
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵  
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۳-۱۷  
کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۴  
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com