

موکوران[®] اکسپکتورانت

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: خلط آور-ضد احتقان-آنتی هیستامین

تسکین موقت سرفه خلط دار به همراه احتقان:

کودکان ۵-۲ سال: ۲/۵-۱/۲۵ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱۰ میلی لیتر.

کودکان ۱۱-۶ سال: ۵-۲/۵ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۲۰ میلی لیتر.

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۱۰-۵ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴۰ میلی لیتر.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به هر یک از ترکیبات موجود در شربت.

در سرفه مزمن (آسم، سیگار، آمفیزم).
در هیپرتنشن.

هرگونه انسداد گوارش-ادراری.
در سابقه آپنه خواب.

در سالمندان مبتلا به سرگیجه.

در بیماری عروق کرنری.

در بیمارانی که داروهای MAOIs مصرف می نمایند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

بعلت احتمال ایجاد اختلال در سطح هوشیاری از انجام رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند پرهیز شود.

احتیاط های مصرف:

احتیاط در مصرف همزمان با داروهای ضد فشار خون.

احتیاط در مصرف همزمان با داروی ترامادول.
مصرف آب زیاد (۸ لیوان در روز) حین درمان جهت کمک به کاهش چسبندگی ترشحات.

تداخلات دارویی:

داروهای مهار کننده های مونو آمینو اکسیداز (ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید، فنلزمین)، داروهای ضد فشار خون (بتا بلاکرها)، متیل دوپا، رزپین، ترامادل، با سایر مواد سرکوب کننده سیستم اعصاب مرکزی (CNS suppressants) مثل الکل، داروهای MAOIs و داروهای TCA، ضد دردهای مخدر و ضد اضطراب های سداتیو و ضد سایکوز (هالوپریدول)، آنتی هیستامین ها، ضد قارچ ها (فلوکونازول)، آنتی بیوتیک های ماکرولیدی، هپارین.

عوارض جانبی:

خواب آلودگی، بی حالی، گیجی، سردرد، احتباس ادرار، تهوع، استفراغ، واکنش های آلرژیک، خشکی دهان، تغییر فشار خون، کهیر، بی قراری و اضطراب، اختلال خواب، ضربان نامنظم قلبی.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

بهمن ۱۳۹۸

صدای مشتری: ۴۴۵۴۵۴۲-۰۲۱