

نیتروگلیسرین پیوسته رهش

Extended Release Tablet
Nitroglycerin Extended Release

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی در ارتباط با منع مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی در دسترس نیست در این خصوص با پزشک خود مشورت کنید.

۶- هشدارها:

این قرص ها حاوی قند می باشند، لذا در صورت عدم تحمل قند قبل از شروع درمان با پزشک معالج خود تماس بگیرید

- فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است..

۷- موارد احتیاط:

- در برخی بیماران خصوصا در مصرف همزمان با الکل و اغلب در شروع درمان، ممکن است باعث کاهش توانایی در رانندگی و یا کار با ماشین آلات شود.

- از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری نمایید.

۸- تداخلات دارویی:

قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع نمایید:
فرآورده های حاوی الکل، داروهای کاهنده فشار خون یا فئوبتازین ها، الکلونیدهای ازگوت، داروهای روان درمانی (داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب)، درمان اختلالات نعوذ (مانند سیلدنافیل یا واردنافیل).

۹- عوارض دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- عوارض جانبی شایعی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

سرگیجه یا سبکی سر بخصوص در تغییر وضعیت ناگهانی از حالت نشسته یا خوابیده، تپش قلب، گرگرفتگی، سردرد، تهوع، استفراغ و بیقراری.

- عوارض جانبی با احتمال وقوع بسیار کم که نیاز به توجه پزشکی دارند:

تاری دید، خشکی دهان، سردرد (شدید یا طولانی مدت)، بثورات پوستی.

- علائم و نشانه های مصرف بیش از حد دارو:

کبودی لب، ناخن یا کف دست ها، سرگیجه یا غش، احساس فشار زیاد در سر، ضعف در تنفس، ضربان بالا و پایین قلب، تب، تشنج.

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- پس از باز شدن در ظرف، فرآورده تا ۲ ماه قابل مصرف می باشد.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده ای دارویی را از طریق قاشق یا زباله های خانگی دور نریزد. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

نیتروگلیسرین ۲/۶ و ۶/۴، قرص های خوراکی پیوسته رهش هستند که حاوی ۲/۶ و یا ۶/۴ میلی گرم نیتروگلیسرین می باشند. نیتروگلیسرین ۲/۶ و ۶/۴ در قوطی های ۱۰۰ عددی، به همراه بروشور داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی

- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر

- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص نیتروگلیسرین ۲/۶ و ۶/۴ بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج تجویز می گردد. جهت جلوگیری از درد قفسه سینه در اثر کاهش خون رسانی به عضله قلب (آنژین صدری) و درمان نارسایی قلبی تجویز می گردد.

مقدار مصرف عمومی:

میزان معمول مصرف اولیه (قرص ۲/۶ میلی گرمی یا ۶/۴ میلی گرم در صبح می باشد. بسته به اثرات مورد نظر پزشک معالج ممکن است میزان مصرف روزانه را به ۳ تا ۴ قرص ۲/۶ میلی گرمی یا ۶/۴ میلی گرمی افزایش دهد. حداقل می بایست ۱۲ ساعت فاصله با آخرین مصرف دوز در روز قبل و اولین مصرف دوز در روز بعد وجود داشته باشد.

حملات آنژین صدری:

در صورت ابتلا به حملات آنژین صدری شبانه پزشک معالج مصرف را در بعدازظهر و عصر تجویز خواهد کرد و مصرف صبح را حذف خواهد نمود.

نارسای قلبی:

درمان نارسای قلبی معمولا در بیمارستان آغاز می شود و پزشک معالج نحوه مصرف دارو را دقیقاً برای شما مشخص می کند.

۳- نحوه مصرف:

- دوره درمان را کامل کنید و دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمایید.

- قرص را به طور کامل بلعیده و از جویدن یا خورد کردن آن خودداری نمایید.

- از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف از دو برابر کردن مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید.

- در صورتی که احساس می کنید که اثرات دارو خیلی شدید یا بیش از حد ضعیف است یا پزشک معالج خود یا دکتر داروساز تماس بگیرید.

۴- موارد منع مصرف:

- سابقه واکنش های آلرژیک (تفصیل قرمزی پوست، خارش، مشکلات تنفسی، افت شدید

فشار خون) به نیتروگلیسرین یا سایر اجزاء فرآورده

- بیماری های کبدی - کلیوی و پرکاری تیروئید

- نارسای قلبی، سکته و حمله قلبی

- افت فشار خون

- کم خونی شدید

- در صورت وجود جراحات اخیر در ناحیه سر

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اردیبهشت ۱۳۹۸



آدرس: تهران، کیلوستر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان جلال، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۴۵۱۳۰-۱۷۰
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com