

هر پیمانه (۵ میلی لیتر) از شربت نوریز کُلد[®]، حاوی ۱۶۰ میلی گرم استامینوفن، ۱۲/۵ میلی گرم هیدرامین هیدروکلراید و ۲/۵ میلی گرم فنیل آفرین هیدروکلراید می باشد، که در جعبه های یک عددی همراه با پیمانه و برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

درمان تب، گلودرد، آبریزش و احتقان بینی:

کودکان ۱۲-۶ سال: ۵ میلی لیتر هر ۴ ساعت.

کودکان ۱۲ سال به بالا و بزرگسالان: ۱۰ میلی لیتر هر ۴ ساعت.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی و خواب آلودگی گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- در صورت عدم بهبودی علائم بیماری پس از ۷ روز از شروع درمان یا در صورت وجود تب، سردرد، سرفه یا خارش های پوستی به پزشک مراجعه کنید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به استامینوفن، دیفن هیدرامین، فنیل آفرین یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن؛ دیفن هیدرامین و فنیل آفرین در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت مصرف همزمان با داروهای MAOIs (ترانیل سیپرومین، فنلژین، ایزوکربوکسازید) در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در خانم های شیرده، نوزادان تازه به دنیا آمده یا نابالغ، در افراد با گلوکوم زاویه بسته، بیماران مبتلا به آسم، افراد با هیپرتروفی پروستات و کودکان زیر ۶ سال در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- این دارو در دوران بارداری با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

- از مصرف این دارو در دوران شیردهی خودداری نمایید.

هشدارها:

- در صورت بدتر شدن علائم بیمار و یا به وجود آمدن علائم جدید، تورم و قرمزی در نواحی مختلف بدن، ادامه تب پس از ۳ روز از مصرف دارو، ادامه درد پس از ۱۰ روز از مصرف دارو در بزرگسالان؛ ۵ روز در کودکان و ۳ روز در نوزادان و در کودکانی که جهت درمان گلودرد استامینوفن مصرف می کنند، باقی ماندن گلودرد کودک برای بیش از ۲ روز همراه با تب، قرمزی، سردرد، تهوع و استفراغ؛ سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- در صورت بروز هرگونه واکنش حساسیتی پوستی شدید در حین مصرف این دارو، سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

- در صورت مصرف همزمان این دارو با کلستیرامین، کلستیرامین را حداقل یک ساعت بعد از مصرف این دارو مصرف کنید.

- از مصرف این دارو بیش از ۷ روز خودداری نمایید.

موارد احتیاط:

این دارو در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در افرادی که بیشتر از ۳ ماه الکل مصرف می کنند به علت ریسک تخریب کبدی

- در افراد مبتلا به نقص در آنزیم G6PD

- در افراد با اختلال سوء جذب مزمن

- در بیماران با اختلال شدید کلیوی

- در بیماران با اختلال عملکرد کبدی یا بیماری فعال کبدی

- در بیماران با اختلال تیروئید، مبتلا به دیابت

- در افراد مبتلا به بیماری های قلبی -عروقی (افراد با بیماری عروق کرونر، بالا بودن فشار خون، بیماری عروق محیطی)

- در افراد با افزایش فشار داخل چشم یا گلوکوم

- در بیماران با مشکلات دفع ادراری به علت بزرگ شدن غده پروستات و هیپرپلازی پروستات

- در سالمندان بالای ۶۰ سال، زیرا سالمندان نسبت به عوارض این دارو حساس تر هستند. عوارضی مثل: توهم، تشنج،

یبوست، خشکی دهان، گیجی و...

- در افراد با بیماری های دستگاه تنفسی تحتانی مثل: آمفیزم، برونشیت مزمن و آسم. زیرا این افراد به عوارض آنتی کولینرژیک این دارو (خشکی دهان و غلیظ تر شدن ترشحات تنفسی) حساس تر هستند.

- در افراد با انسداد معده و دوندوم

- در بیماران با اختلال تیروئید، مبتلا به دیابت

- در افراد مبتلا به بیماری های قلبی -عروقی (افراد با بیماری عروق کرونر، بالا بودن فشار خون، بیماری عروق محیطی)

- در افراد با افزایش فشار داخل چشم یا گلوکوم

- در بیماران با مشکلات دفع ادراری به علت بزرگ شدن غده پروستات و هیپرپلازی پروستات

- در سالمندان بالای ۶۰ سال، زیرا سالمندان نسبت به عوارض این دارو حساس تر هستند. عوارضی مثل: توهّم، تشنّج، یبوست، خشکی دهان، گیجی و...

- در افراد با بیماری های دستگاه تنفسی تحتانی مثل: آمفیزم، برونشیت مزمن و آسم. زیرا این افراد به عوارض آنتی کولینرژیک این دارو (خشکی دهان و غلیظ تر شدن ترشحات تنفسی) حساس تر هستند.

- در افراد با انسداد معده و دوندوم

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

لینزولید، متیل دوبا، TCAs، MAOIs (آمی تریپتیلین، نورتریپتیلین، کلومیپرامین، ایمی پرامین، دوکسپین)، الککل، باربیتورات، بوسلفان، کاربامازپین، کلستیرامین، داپسون، ایمانتینیب، ایزونیاژید، لاموتریزین، نیتریک اکساید، پریلوکانتین، پروینسید، نیتريت سدیم، وارفارین، آمفتامین، اپیوئید، آریپیپرازول، آزلاستین (بینی)، بتاهیستین، بریمونیدین (موضعی)، بوپروفرین، گلوکاگون، هیدروکدون، هیدروکسی زین، ایپراتروپیوم (استنشاقی)، منیزیم سولفات، میرتازاپین، پتاسیم کلراید، پرامی پکسیول، فورزماید، روپینیپول، SSRIs، تیوریدازین، تیوتروپیوم، توپیرامات، زولپیدم، لووفلوکساسین، موکسی فلوکساسین، زیراسیدون، کینیدین، سوتالول، کلرپرومازین، کلارتیرومایسین، اریترومايسين، کدئین، دکسوروبیسين، متوپرولول، پروپافتون، تاموکسیفن، ترامادول.

نحوه صحیح مصرف دارو:

دارو را می توان همراه یا بدون غذا مصرف نمود، در صورت بروز عارضه گوارشی، می توان دارو را همراه با غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

راش پوستی، کاهش پیکربنات سدیم خون، کاهش سطح کلسیم و سدیم سرم، افزایش اوره خون، افزایش گلوکز سرم، آنمی، لوکوپنی، نوتروپنی، افزایش آلکالین فسفاتاز سرم، افزایش بیلی روبین سرم، آگرانولوسیتوز، آریتمی، تیش قلب، افزایش یا کاهش ضربان قلب، افزایش فشار خون گذرا، سردرد، احساس سبکی سر، سرگیجه، لرزش بدن، بی خوابی، عصبی شدن، بی قراری، ضعف، تهوع، احتباس ادرار در افراد با هیپرتروفی پروستات، دیس تونی عضلات، تعریق، تغییرات ECG قلب، تشنّج، خواب آلودگی، توهّم، کابوس شبانه، افزایش وزن، ژئیکوماستی، بی اشتها، یبوست، طعم تلخ در دهان، تاری دید، درد چشم، وزوز گوش، اختلال دید، اسهال، آنمی آپلاستیک، آپسسه ادم، آبریزش چشم.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: دی ۱۳۹۷