

در صورت داشتن فشار بالای چشم، احتیاط اداری، بیماری های مزمن تنفسی و آسم و یا اختلال در عملکرد غده تیروئید
در بیماران دارای فاکتور هایی من جمله سوء جذب تغذیه ای، وزن پایین، سنین بالا و بیماری های تب دار
در بیماران با کمبود آنزیم گلوکز ۶- فسفات دهیدروژناز (بیماری فاویسم)
در بیماران با نارسایی کبدی یا داشتن بیماری کبدی قهال
در صورت مصرف همزمان با دارو های آرام بخش

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی در خصوص مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمائید.

تداخلات دارویی:

در صورتی که از دارو های زیر استفاده می کنید و یا امکان دارد این دارو ها را شروع کنید، با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمائید.
ترکیبات آنتی کولینرژیک مانند (تیتروپیوم، ایراتروپیوم (استنشاقی)، اکلیپینوم و...)، آزلاستین (داخل بینی)، بتاسیم سیرتات و بتاسیم کلراید، لینزولید، مشتقات ارگوت، دارو های مهار کننده مونو آمین اکسیداز، دارو های ضد درد اپیوئیدی، دارو های آرام بخش و خواب آور، دارو های مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین، سمپاتومیتیک ها، الکل، باربیتورات ها، دارو های مهار کننده استیل گولین

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد. اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار دارو مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند.
لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است.
خواب آلودگی، ضمیم شدن ترشحات برونش، سرگیجه، سردرد، بی قراری، دردشکمی، افزایش اشتها، تهوع، خشکی دهان، دوبینی، درد مفصل و احتیاط اداری

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمائید.

حتماً جعبه دارو را نزد خود نگه داشته و به پزشک نشان دهید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمائید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه احواء آن سؤال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اسفند ۱۴۰۰

قرص چهار جزئی نوریز کاف حاوی ۵۰ میلی گرم استامینوفن، ۵ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید، ۱۵ میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبرماید و ۲ میلی گرم کلرفنیرامین مالئات می باشد که در پلیستر های ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی همراه با متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

راهنمای عمومی:

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

- بارداری و یا شیردهی

- استفاده از سایر داروها

مکانیسم اثر:

استامینوفن موجود در این دارو با اثر بر روی سیستم اعصاب مرکزی، موجب ایجاد اثرات ضد درد و ضد تب می گردد. کلرفنیرامین با اثر آنتی هیستامینی خود در درمان علائم آلرژیک کمک کننده است. همچنین فنیل افرین با اثر بر روی گیرنده های سمپاتومیتیک، در درمان احتقان بینی مورد استفاده قرار می گیرد. دکسترومتورفان نیز با کاهش حساسیت گیرنده های سرفه و اختلال در انتقال سیگنال های سرفه تاثیر خود را اعمال می کند.

موارد مصرف:

قرص نوریز کاف در کاهش تب و درد، احتقان و گرفتگی بینی، کاهش علائم آلرژ و آبریزش بینی و همچنین مهار سرفه به کار می رود.

نحوه مصرف:

این دارو را دقیقاً همانطور که پزشک تجویز نموده است مصرف کنید. مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۲-۱ عدد قرص هر ۶ ساعت (حداکثر مقدار مجاز مصرفی ۸ عدد قرص در طی شبانه روز می باشد).

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به هر یک از اجزای به کار رفته در این دارو

از مصرف همزمان با دارو های مهار کننده مونو آمین اکسیداز (MAOIs) و یا در فاصله زمانی کمتر از دو هفته پس از قطع این دارو ها به علت بروز سندرم سروتونین (علائمی چون بی قراری، گیجی، تهوع، لرزش، افزایش ضربان قلب و انقباض عضلات) خودداری نمائید.

هشدار ها:

دور مصرف دارو را بر طبق نظر پزشک ادامه دهید و دارو را خودسرانه قطع نکنید.
بسیاری از دارو های چند جزئی مورد استفاده در سرماخوردگی، حاوی ترکیبات یکسانی می باشند، لذا از مصرف همزمان آنها جهت جلوگیری از بروز سمیت خودداری نمائید.
از مصرف طولانی مدت و بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمائید.
در کودکان زیر ۱۲ سال مصرف این دارو با تجویز پزشک صورت گیرد.
در صورت عدم بهبود علائم پس از گذشت ۲ روز و یا بروز تب، به پزشک خود اطلاع دهید.
از مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۵ سال خودداری نمائید.

احتیاطات مصرف:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر، قبل از مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید:

در صورت داشتن مشکلات قلبی و عروقی مانند بالا بودن فشار خون