نوریز کلد®

استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین

هر عددی قرص خوراکی خط دار حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن، ۵ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید و ۲۵ میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید به عنوان ماده موثر دارویی می باشد که در بلیستر ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی به همراه متن راهنمای محصـــول، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصـــرف آن در موارد مشـــابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

وجود هرگونه حساسیت به دارو یا ترکیبات سازنده آن

بارداری و یا شیردهی

استفاده از سایر داروها

ابتلا به بیماری های دیگر

موارد مصرف:

این داروی ترکیبی برای کاهش و درمان موقت علائم ناشـی از سرماخوردگی، آنفولانزا، آلرژی یا سـایر بیماری های تنفســی (مانند سینوزیت، برونشـــیت) استفاده می شود و به کاهش طول مدت بیماری و یا درمان آن کمک نمیکند. استامینوفن یک تســـکین دهنده درد و تب است. فنیل افرین هیدروکلراید(ضد احتقان) به علائم گرفتگی بینی، ســـــــینوس و گرفتگی گوش کمک میکند و دیفن هیدرامین(آنتی هیستامین) به تسکین آبریزش چشم و بینی، خارش چشم، بینی، گلو و عطسه کمک می کند.

مقدار و نحوه ی مصرف:

مقدار و نحوه مصـرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصـرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهایی که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

این دارو را همراه غذا و یا بدون آن با مایعات فراوان مصرف نمایید . بهتر است، به منظور کاهش تحریکات گوارشی با غذا و یا شیر مصرف گردد.

بهتر است این دارو با معده خالی مصرف نگردد.

بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا: ۲-۱ قرص هر ۶-۴ ساعت یک بار در روز. حداکثر مقدار مصـرف ۶ عدد قرص در روز می باشد.

در شرایط خاص و تحت نظر پزشک معالج تا حداکثر ۸ عدد قرص در روز قابل مصرف است.

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

در کودکان زیر ۱۲ سال مگر تحت نظر پزشک معالج

آب سیاه چشم با زاویه بسته

انسداد گردن مثانه

موارد احتیاط و هشدارها:

مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک خود افزایش ندهید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، سریعا به بیمارستان مراجعه کنید.

اگر هر یک از مشـــکلات زیر را دارید، قبل از استفاده از این دارو با پزشک یا داروساز خود مشـــورت کنید: مشکلات تنفسی (مانند آسم، آمفیزم)، دیابت، گلوکوم، مشکلات قلبی، فشار خون بالا، مشکلات کلیوی، بیماری کبدی، تشنج، مشکلات معده/روده ای(مانند انســداد، پیوست، زخم)، پرکاری تیروئید، مشـــکلات ادرار(مانند مشکل در ادرار کردن به دلیل بزرگ شدن پروستات، احتباس ادرار)

این دارو ممکن است سبب گیجی، خواب آلودگی، تاری دید و کم شدن هوشیاری در برخی افراد شـود. لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

از مصرف همزمان این دارو با نوشیدنی های الکلی خودداری نمایید.

قبل ازهرگونه عمل جراحی(شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان های فوریت دار پزشـکی، به پزشـک یا دندانپزشک خود مصرف این دارو را اطلاع دهید.

کودکان معمولاً حساسیت بیشتری نسبت به اثرات این دارو دارند. در کودکان با سن کم، آنتی هیســتامین ها ممکن است به جای خواب آوری باعث تحریک و هیجان شـوند و عوارض نا خواســته ای مثل افزایش فشـار خون، کابوس های شبانه، عصـبانیت و بیقراری داشته باشند. لذا مصـرف آن باید تحت نظر پزشک معالج باشد.

افراد مسن ممکن است به اثرات این دارو حسـاسیت بیشـتری نشـان دهند؛ به ویژه سرگیجه که می تواند خطر زمین خوردن را افزایش دهد، خواب آلودگی و مشـکلات خواب، گیجی، یبوست، مشـکل در ادرار کردن، ضربان قلب سریع/نامنظم. از مصـــرف همزمان این دارو با داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید. این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسـایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید. در صورت مصـرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه نمایید.

ATW.283/LF.0

Noriz Cold®

Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine

در کودکان کمتر از ۱۲ سال نباید مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

به عنوان یک اقدام احتیاطی ترجیح داده می شود، از مصـــــرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی خودداری نمایید.

در دوران بارداری، مصرف این دارو فقط در موارد ضروری و با مشورت پزشک معالج مجاز است.

این دارو ممکن است به شیر مادر منتقل شـود و اثرات نامطلوبی بر روی نوزاد شـیرخوار بگذارد، لذا قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

در بسـیاری از افرادی که از این دارو استفاده می کنند عوارض جانبی جدی مشـاهده نشـده است، ولی در صورت بروز و تداوم هر کدام از عوارض زیر:

خواب آلودگی، سرگیجه، تاری دید، ناراحتی معده، حالت تهوع، عصبی شدن یا خشکی دهان، بینی و گلو

در صورت بروز هریک از این عوارض جانبی جدی:

تغییرات ذهنی، خلقی(مانند گیجی، توهم)، لرزش، مشکل در ادرار کردن

در صورت بروز هر یک از این عوارض جانبی نادر اما جدی:

ضربان قلب سریع/آهسته و نامنظم، تشنج

واکنش آلرژیک بسیار جدی به این دارو نادر است. با این حال، در صورت مشـاهده علائم واکنش آلرژیک جدی، از جمله:

بثورات پوستی، خارش، تورم(به ویژه در صورت، زبان، گلو)، سرگیجه شدید، مشکل تنفس فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شـما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیســت زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیســت. بهتر است لیســتی از تمام محصولاتی که استفاده می کنید(از جمله داروهای بدون نسخه و محصـولات گیاهی) نگه دارید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصـــرف داروها را شروع، متوقف یا تغییر ندهید.

کتوکونازول، مصـــــرف مهارکننده های MAO با این دارو ممکن است باعث تداخل دارویی جدی (احتمالاً کشـــنده) شود. در طول درمان با این دارو از مصـــــرف داروهای مهار کننده MAO (ایزوکربوکسازید، لاینزولید، متیلن بلو، موکلوبماید، فنلزین، پروکاربازین، راسآژیلین، سافینامید، سلژیلین، ترانیل ســـیپرومین) خودداری کنید. اکثر داروهای مهار کننده MAO نیز نباید به مدت دو هفته قبل از درمان با این دارو مصرف شوند. از پزشک خود در مورد زمان شروع یا قطع مصرف این دارو بپرسید.

اگر از محصـولات دیگری که باعث خواب آلودگی می شوند مانند مسـکن های حاوی مخدر یا تســکین دهنده های سرفه(مانند کدئین، هیدروکدون)، الکل، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی شامل آسپیرین یا سایر سالیسیلات ها، داروهای خواب آور یا ضد اضطراب (مانند آلپرازولام، لورازپام، زولپیدم)، شل کننده های عضـــلانی (مانند کاربســـــوپرودول، سیکلوبنزاپرین)، داروهای ضد انقباد خون، داروهای آنتی هیستامین(مانند ستیریزین، دیفن هیدرامین) یا محصـولات پوستی حاوی آنتی هیسـتامین ها(مانند کرم دیفن هیدرامین، پماد، اسپری) یا پزشک خود مشورت نمایید.

این دارو ممکن است در برخی آزمایشـــــات(مانند آزمایش غربالگری دارو در ادرار، ادرار 5-HIAA) تداخل ایجاد کند و احتمالاً باعث خطا در نتایج آزمایش شود. اطمینان حاصل کنید که پرسنل آزمایشگاه و پزشک معالج از استفاده شما از این دارو مطلع هستند.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضـــلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۴۰۰

شرکت داروسازی خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال، بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵

کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲ تلفن: ۱۷-۴۴۵۴۵۴۱۳-۰۲۱

www.kharazmipharm.com info@kharazmipharm.com