

PrizelGut®

Omeprazole 20

پرزیل گات®

امپرازول ۲۰

کپسول پرزیل گات® حاوی ۲۰ میلی گرم گراونهای انتریک کوند امپرازول می باشد که در قوطی های ۲۸ عددی درون جعبه همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. این مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

زخم دئودنال:

پرزیل گات: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴ هفته.

ازوفاژیت فرسایشی:

پرزیل گات: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۸-۴ هفته.

زخم معده:

پرزیل گات: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۸-۴ هفته.

سوزش سر دل:

پرزیل گات: ۲۰ میلی گرم روزانه برای ۱۴ روز.

زخم دارویی هلیکوباکتر پیلوری همراه با کلاریترومایسین:

پرزیل گات: در ابتدا ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۲ روز، در صورت عدم بهبودی می توان

دارو را به صورت ۲۰ میلی گرم روزانه برای ۱۴ روز دیگر ادامه داد.

زخم دارویی هلیکوباکتر پیلوری همراه با کلاریترومایسین و آموکسی سیلین:

پرزیل گات: ۲۰ میلی گرم دو بار در روز برای ۱۰ روز، در صورت عدم بهبودی می توان دارو را به

صورت ۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۸ روز دیگر ادامه داد.

رفلاکس عارضه دستگاه گوارش (همراه با کازین مری):

پرزیل گات: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز تا ۴ هفته.

پیشگیری از زخم های ناشی از استرس:

پرزیل گات: ۴۰ میلی گرم روزانه.

راهنمای های عمومی:

این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن

به دیگران، خودداری نمایید.

موارد مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به امپرازول یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت

نمایند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

امپرازول در شیر ترشح شده و عوارضی برای کودک ایجاد می کند.

امپرازول در دوران بارداری و شیردهی فقط زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

هشدارها:

استفاده طولانی مدت از امپرازول باعث گاستریت اتروفی (التهاب مزمن موزک معده که باعث کاهش

سلول های ترشحی و جایگزینی آن ها با لایه های فیبری می گردد.

در صورت کاهش منیزیم بدن در حین مصرف امپرازول، سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه

کنید.

درمان طولانی مدت (بیش از دو سال) با امپرازول باعث سوء جذب ویتامین B₁₂ در بدن می شود

که این علامت در ختم ها و افراد زیر ۲۰ سال بیشتر رخ می دهد.

در طی مصرف امپرازول در صورت ابتلا به اسهال شدید غیر قابل بهبود، سریعاً دارو را قطع کرده و

به پزشک مراجعه کنید. این عارضه می تواند مربوط به اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل به علت

مصرف امپرازول باشد.

استفاده از امپرازول ریسک عفونت سالمونلای را افزایش می دهد.

در صورت ابتلا به هرگونه اختلال کلیوی شدید در طی مصرف امپرازول، دارو را قطع کرده و سریعاً

به پزشک مراجعه نمایید.

از مصرف همزمان امپرازول با داروهای کلونیدوگرل (پلاویکس®)، لرتونین، پیموزاید، پوساکونازول،

رفامپین، زیردوینیت، گیاه علف جای و وریکونازول بهره‌برد.

در صورت مصرف همزمان امپرازول و سیتالوپرام، حاکتاز دوز مجاز روزانه سیتالوپرام در مصرف همزمان

۲۰ میلی گرم می باشد و در این صورت بیمار باید به طور مرتب معده خالی از سمیت سیتالوپرام

ازبایی شود. علائم سمیت: سندرم سروتونین و افزایش QT

موارد احتیاط:

امپرازول برافراد با سابقه کستگی های ناشی از پوکی استخوان که به مدت طولانی یا با دوز بالا از

امپرازول استفاده می کنند، یا مصرف مصرف خود زیرا امپرازول ریسک کستگی استخوان را افزایش

می دهد و این افراد باید به طور مرتب ارزیابی شوند و در طی درمان از مکمل های کلسیم و ویتامین

دی استفاده نمایند.

امپرازول در افراد با اختلال کلیه باید با احتیاط مصرف شود و دوز روز توسط پزشک معالج تنظیم

گردد.

در طی ۳ تا ۴ سال از مصرف امپرازول احتمال هیپومیزمی (کاهش شدید منیزیم بدن) وجود

دارد که عوارضی مانند تشنج و آریتمی ایجاد می کند. بنابراین در ابتدا و حین درمان طولانی مدت با

امپرازول به طور مرتب باید سطح منیزیم خون اندازه گیری شود، خصوصاً در کسانی که در کنار امپرازول

از دیگوکسین، دیورتیک ها و سایر داروهای که سطح منیزیم خون را کم می کنند، استفاده می نمایند.

که در این افراد باید حتماً مکمل منیزیم مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید:

آرپیپرازول، زیدروینیت، کاردیپول، سیستالوپرام، کلونیدوگرل، کلراپین، سیکلوسپورین،

دایگاکسین، لرتونین، اس سیتالوپرام، فلونکازول، هیدروکدون، ایندیناوار، نمک های آهن،

انتریکونازول، کونژونازول، مزلامین، متوترکسات، متیل فنیدیت، مایکوفولات، فنی توئین، پیموزاید،

پوساکونازول، ریفامپین، گیاه علف جای، تاکرولیمول، وارفارین، وریکونازول.

نحوه صحیح مصرف دارو:

امپرازول را قبل از غذا مصرف کنید.

کپسول را به طور کامل بلعیده و از خوردن و جویدن آن بهره‌برد.

در افرادی که توانایی بلع کپسول را ندارند، می توان کپسول را باز کرده و محتویات آن را با یک قاشق

غذائوری آب سیب مخلوط کرد. مخلوط تهیه شده را سریعاً با یک لیوان آب خنک مصرف کنید.

مخلوط تهیه شده را نباید جوید و یا خرد کرد و از نگهداری آن خودداری کرده و بلافاصله مصرف کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر

چشمه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود

مشورت نمایید:

سردرد، درد شکمی، تهوع، اسهال، استفراغ، نفخ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، پیوست، سرگیجه

راش پوستی، درد مفاصل، درد گردن، کوفت (۲-۳ سال)، اگر آلوپسی، زردی، واکشن های آلرژیک (شوک

آنافیلاکسی، آنوریام و...)، به اشتباهی، اضطراب، دوپینی، خشکی چشم و دهان و پوست، افزایش

قشار خون، افزایش کراتینین، خون آتکالین سفاتاز، افزایش بیلی روبین، ALT و AST خون.

سمیت‌ها:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

کپسول را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فارورده یا دارویی را از طریق قاشق یا زباله های خانگی دور نریزد. در مورد نحوه ی امحاء

آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی - تهران - ایران

تاریخ تحریر بازرسی و تدوین: خرداد ۱۳۹۷

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا چال

کپسول را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۲۱۳۱۷-۱۷-۱۳۸۹۷۱۵۸۲

www.kharazmipharm.com info@kharazmipharm.com

