

داروهای رقیق کننده خون (مثل وارفارین)، داروی قلبی دیگوکسین، انواع آنتی بیوتیک ها شامل (تتراسایکلین ها، کلینولن ها)، کلسیتامین، اورلیستات، سایر مکمل های حاوی کلسیم و ویتامین دی، آنتی اسید های معده.

عوارض جانبی دارو:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود.

اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

یبوست، ناراحتی معده، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، کاهش وزن غیر عادی، تشنگی افرافی، ازدیاد دفع ادرار، سردرد، درد عضله و استخوان، ضعف و خستگی.

شرایط نگهداری:

-فرآورده را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
-فرآورده، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: دی ۱۴۰۱

این فرآورده به شکل قرص خوراکی روکش دار حاوی کلسیم کربنات (۶۲۵ میلی گرم)، ویتامین K_{2.7} (۴۵ میکروگرم)، ویتامین D₃ (۲۰۰ واحد بین المللی) می باشد، که در شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود. این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.

موارد مصرف:

این محصول در موارد نیاز به تامین کلسیم، ویتامین K_{2.7}، ویتامین D₃ جهت کمک به سلامت استخوان ها مورد مصرف می باشد.

کلسیم: کلسیم در ساختار استخوان ها مشارکت دارد و به همین علت مصرف کلسیم در تشکیل بافت استخوانی بسیار مهم است.

ویتامین D₃: این ویتامین موجب افزایش جذب کلسیم از روده می شود. مصرف مقدار مناسب این ویتامین به خصوص در نوجوانان و زنان در سنین پائین اهمیت ویژه ای دارد.

ویتامین K_{2.7}: این ویتامین از رسوب کلسیم در بافت های مانند عروق، کلیه و سایر بافت های نرم پیشگیری می کند، همچنین در افزایش ذخیره کلسیم استخوان ها نقش مهمی دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

-بزرگسالان روزانه یک تا دو قرص همراه غذا یا یک لیوان پر از آب مصرف نمایند.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمائید:
-در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ویتامین ها یا هر یک از اجزای فرآورده.
-سارکوئیدوزیس.

مصرف در بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با پزشک معالج مشورت شود.

هشدارها:

بهر است بین مصرف این مکمل با داروهای دیگر ۲ الی ۴ ساعت فاصله باشد.

موارد احتیاط:

در صورت ابتلا به بیماری های ذیل قبل از مصرف پزشک معالج خود را مطلع نمائید:
هایپرکلسمی، هایپر ویتامینوزیس دی، نارسایی شدید کلیوی و سنگ کلیه، سندروم عدم توانایی جذب مواد غذایی، سرطان، اختلال غده پاراتیروئید.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمائید، پزشک معالج خود را مطلع سازید: