

نحوه صحیح مصرف:

قرص باید به طور کامل بلعیده شود، از شکستن و خرد کردن و جویدن آن بپرهیزد.

قرص را میتوان به همراه غذا یا با فاصله از غذا مصرف نمود. بهترین زمان مصرف صبح یا قبل از صبحانه می باشد.

در افرادی که توانایی بلع ندارند، می توان قرص را فقط در آب سیب حل نمود و سی دقیقه قبل از غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

درد شکمی، افزایش آنزیم کبدی، اضطراب، درد مفصل، خستگی و ضعف، درد کمر، التهاب پروش ها، درد قفسه سینه، گجی، اسهال، بیوست، تهوع، استفراغ، سوزش سر دل، نفخ، کوتاه شدن تنفس، اختلالات گوارشی، میگرن و سردرد، افزایش قند خون، افزایش چربی خون، سفتی عضلات، بی خوابی، عفونت گوارشی و ادراری، تکرر ادرار، تغییر عملکرد کبدی، ادم، خشکی دهان، تغییرات وزن، راش پوستی

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، و دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.

- هیچ فرایند یا دارویی را از طریق فاصله یا زباله های خانگی دور بریزد. در مورد نحوه ای امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: آبان ۱۳۹۶

هر قرص پنتوفلکس® اتريک کودت حاوی ۴۰ میلی گرم پنتوپرازول است. که در ۳ بلیست ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی، همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

این دارو با کاهش ترشح اسید معده در درمان بیماری های زخم معده و زخم دوازده، رفلاکس معده (پرگشت اسید از معده به مری)، سندروم زولینگر-الیسون و در پروتکل درمان هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود.

دسته دارویی: مهارکننده ی پمپ پروتون

درمان رفلاکس معده به مری: ۴۰-۲۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴ هفته

برای پیشگیری از رفلاکس معده به مری: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز

درمان بیماری زخم معده: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴-۸ هفته

درمان بیماری زخم دوازده: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۴ هفته

پیشگیری از زخم ایجاد شده توسط داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، جداً خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به پنتوپرازول یا سایر اجزای فرمولاسیون با پزشک خود مشورت نمایید.

مطالعات کافی در زمینه عوارض این فرآورده بر روی جنین در دوران بارداری انجام نشده است. در شیر ترشح می شود. لذا مصرف آن در طول دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد و فواید مصرف فرآورده در برابر مضرات آن سنجیده شود.

هشدارها:

قبل و در حین درمان طولانی مدت با پنتوپرازول، اندازه گیری سطح سرمی منیزیم پیشنهاد می شود. کاهش سطح سرمی منیزیم با علائمی مثل انقباض غیر ارادی ماهیچه ها، خستگی، تشنج، گجی و بی نظمی ریتم قلب می شود.

مصرف طولانی مدت پنتوپرازول (بیش از سه سال) ممکن است منجر به کاهش جذب ویتامین B12 شود.

موارد احتیاط:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات زیر قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

در افراد با نارسایی شدید کبدی، افراد مبتلا به یوکی استخوان و بیماری که کورتیکواستروئید مصرف می کنند.

تداخل های دارویی:

سالیسیلات، متوترکسات، پوسا کونازول، فلوکونازول، کتوکانازول، ایتراکانازول و وارفارین، دیگوکسین، مایکوفنولات، آمپی سیلین، نمک های آهن، فلوکسامین، ریفامپین، گیاه

Hypericum perforatum