

پاراکفن®، کپسول خوراکی حاوی استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم، کافئین ۴۰ میلی گرم و ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم در هر کپسول میباشد که به همراه یک بروشور داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- * وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی
- * استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر
- * اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف کپسول پاراکفن® بسته به شرایط بیماری و بیمار توسط پزشک معالج جهت درمان تب و دردهای خفیف تا متوسط مانند سردرد، دندان درد، دردهای عضلانی و دردهای زمان قاعدگی تجویز می گردد.

میزان مصرف عمومی به شرح ذیل میباشد:

بزرگسالان: هر هشت ساعت یک کپسول میل شود (حداکثر سه کپسول در روز)

۳- نحوه مصرف:

- کپسول را به طور کامل بلعیده و یا باز کردن، جویدن و یا خرد کردن محتویات خودداری نمایید.

- دارو را با معده پر و مطابق دستور مصرف کنید.

- در صورت فراموش کردن نحوه مصرف دارو، از پزشک یا داروساز سوال کنید.

۴- موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به هریک از اجزای دارو از مصرف آن خودداری نمایید.

- این دارو در افراد زیر ۱۲ سال توصیه نمیشود.

- در صورت وجود اختلالات خونی مانند هموفیلی، فون ویلبراند و یا اختلالات پلاکتی از مصرف این دارو اجتناب شود.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

- در صورت بارداری یا شیردهی پیش از مصرف پاراکفن® با پزشک خود مشورت نمایید.

۶- هشدارها:

- کپسول پاراکفن® حاوی استامینوفن میباشد لذا از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری شود.

- به علت وجود کافئین در این محصول از مصرف بیش از حد فرآورده های خوراکی حاوی کافئین، به همراه این دارو خودداری نمایید.

- در صورت عدم بهبودی در علائم یا بدتر شدن آنها با پزشک خود مشورت نمایید.

- از مصرف این دارو با معده خالی خودداری کنید.

۷- موارد احتیاط:

- مصرف این دارو در نوجوانان مبتلا به بیماریهای آنفولانزا و آبله مرغان فقط زیر نظر پزشک معالج مجاز است.

محصر این دارو در الکلیسم فعال توصیه نمیشود.

۸- تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای ضد فشار خون (مثل مهار کننده آنژیوتانسین)، داروهای رفیق کننده خون (مثل وارفارین و اسپرین)، لیتیم کربنات، سیکلوسپورین، متوترکسات، ترامتین، والپروئیک اسید.

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده احتمال آسیبهای کبدی به دلیل داشتن استامینوفن و در مصرف طولانی مدت احتمال پتورات جلدی، درمانیت آلرژیک، اختلالات خونی و پانکراتیت حاد وجود دارد.

- تهوع، اسهال و زخمهای گوارشی.

- در مواردی زوز گوش، سردرد، گیجی و برونکواسپاسم.

۱۰- شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود و در دور دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۳۹۸

