

Perphenazine

–مصرف پرفتازین ممکن است باعث بروز عوارض خارج هرمی گردد، که بعضی عوارض در ابتدای درمان و بعضی دیگر سال ها پس از آغاز درمان ایجاد می شوند، فرم های حاد، وابسته به دوز هستند و پس از قطع داروی ایجاد کننده عارضه، به سرعت از بین می روند؛ دیس تونی حاد و تاخیری (افزایش غیر عادی تون عضلانی و باقی ماندن عضله در یک انقباض پیوسته و پایدار)، دیس کینزی تاخیری (حرکات غیر ارادی)، اکاتیازیا حاد و تاخیری (بی قراری، تکان خوردن های مکرر و بروز حرکات غیر هدفمند است)، پارکینسونیسم (بی حرکی، کندگی حرکات، لرزش، حرکات پرشی اندام ها).

–در حین مصرف دارو، در صورت بروز علائم سندرم نورولیتیک بدخیم (افزایش دمای بدن به بالاتر از ۳۸ درجه سانتیگراد، سختی عضلانی، تغییر سطح هوشیاری، افزایش ضربان قلب، فشار خون ناپایدار، تعریق شدید، تنگی نفس، افزایش تعداد تنفس در دقیقه، بی اختیاری ادرار و مدفوع) دارو را قطع کرده و سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایند.

موارد احتیاط:

پرفتازین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

–در افراد با بیماری های قلبی (زیاد بودن فاصله QT قلب)، در بیماران با گلوکوم زاویه بسته، در بیماران با سابقه تشنج و ضربه به سر و بیماران مبتلا به دیابت.

–مصرف پرفتازین ممکن است در آزمایش پرولاکتین اختلال ایجاد کرده و باعث افزایش سطح پرولاکتین شود.

–مصرف این دارو ممکن است باعث افزایش سطح آنزیم های کبدی (ALT و AST) شود.

–توصیه می شود قبل از شروع درمان، به خصوص در افراد مسن و افراد با مشکلات قلبی و بیماری که داروهای آنتی آریتمی مصرف می کنند، ارزیابی الکتروکاردیوگرام قلب و سطح سرمی پتاسیم و منیزیم اندازه گیری شود.

–در بیماران که به صورت مزمن پرفتازین را مصرف می کنند، بهتر است به صورت دوره ای معاینات چشم پزشکی انجام شود.

–اگر در حین مصرف دارو دچار عوارض زردی کلسیتاتیک (تب و لرز، تهوع، درد ناحیه فوقانی شکم، احساس ناخوشی و خارش) شدید، دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید:

میرتازاپین، پتاسیم کلراید، پک ایترفرون آلفا 2b، الکل، SSRIs (سرتراپین، فلوکستین، سیتالوپرام و...)، توپیرامات، زولیدم، هیدروکلروتیازید، تیوتروپیوم، تری هگزری فنییدل، کینین، کینیدین، کلروکین، اریپیرازول، آزلاستین (بینی)، متوپرولول، اتنولول، برموئیدین (موضعی)، گلوکاگون، هیدروکدون، هیدروسکی زین، ایپراتریوپوم (اسپری دهانی)، لیتیم، منیزیم سولفات، متیل فنیدیت، متوکلوپرامید، بنزتروپین.

هر عدد قرص خوراکی روکشدار پرفتازین ۲، حاوی ۲ میلیگرم پرفتازین بعنوان ماده موثره دارویی بوده و هر عدد قرص خوراکی روکشدار پرفتازین ۴، حاوی ۴ میلیگرم پرفتازین بعنوان ماده موثره دارویی بوده و هر عدد قرص خوراکی روکشدار خط دار پرفتازین ۸، حاوی ۸ میلیگرم پرفتازین بعنوان ماده موثره دارویی بوده که داخل جعبه به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: آنتی سایکوتیک

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

درمان اسکیزوفرنی:

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان:

بیماران بستری در بیمارستان: دوز معمول، ۱۶-۸ میلی گرم، ۲-۴ بار در روز. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۶۴ میلی گرم.

بیماران بستری در خانه: دوز ابتدایی، ۸-۴ میلی گرم، ۳ بار در روز.

درمان تهوع و استفراغ شدید:

بزرگسالان: ۱۶-۸ میلی گرم روزانه در دوزهای منقسم.

راهنمایی های عمومی:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

–در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به پرفتازین یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

–در صورت ابتلا به اختلال کبدی، در بیماران با سرکوب مغز استخوان و بیماران مشکوک به آسیب مغزی در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری و شیردهی بهتر است مصرف نشود، مگر زیر نظر پزشک معالج.

هشدار ها:

–در ابتدای درمان و پس از هر بار افزایش دوز، به آهستگی از حالت نشسته به ایستاده تغییر وضعیت دهید، زیرا احتمال افت فشار خون وضعیتی وجود دارد، به خصوص در بیماران دیابتی با زمینه مشکلات قلبی-عروقی و افراد مسن.

–در طول مصرف دارو، از قرار گرفتن در مقابل نور مستقیم خورشید خودداری کرده و از ضد آفتاب، کلاه و لباس پوشاندن مناسب استفاده نمایید، زیرا احتمال دارد در نواحی ای که در معرض نور خورشید قرار دارند، رنگ پوست به آبی متمایل به خاکستری یا ارغوانی تغییر رنگ دهد، که این عارضه معمولاً همراه با تغییر رنگ عدسی یا قرنیه چشم رخ می دهد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

دیس کینزی، اختلالات انزال، آمنوره، زنیکوماستی (بزرگ شدن پستان)، گالاکتوره (خروج شیر از پستان)، بی نظمی قاعدگی، اگزما، قرمزی پوست، حساسیت به نور، خارش، تغییرات رنگدانه های پوست، کهیر، بی اشتها، بیبوست، خشکی دهان، تهوع، افزایش بزاق، استفراغ، افزایش وزن، کاهش ضربان قلب، بی قراری، ناهماهنگی عضلات بدن، گیجی، تشنج، سرگیجه، رویاهای غیر عادی، خواب آلودگی، دیس تونی، عوارض اکسترایرامیدال، سردرد، بیش فعالی، کاهش میل جنسی، علائم شبه پارکینسون، اختلال عملکرد کبدی، تاری دید، تب، احتباس ادرار، آنمی همولیتیک، لوکوپنی (کاهش گلبول های سفید خون)، سنگ صفر، افت فشار خون وضعیتی.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق قاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا چالاب،
پن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۴۱۳۰ - ۴۴۵۴۴۱۳۱
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com