

هشدارها:

-بهرت است در طول مصرف دارو از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری به غیر از قرص های جلوگیری از بارداری استفاده شود.

-فنوباربیتال در کودکان و سالمندان ممکن است بیشتر باعث تحریک شود تا آرامش.

-بهرت است این دارو در کودکان زیر ۴ سال مصرف نشود، مگر زیر نظر پزشک معالج.

-از قطع ناگهانی فنوباربیتال پرهیزید. زیرا قطع ناگهانی دارو باعث بروز علائم زیر می شود:

علائم مینور: این علائم ۱۲-۸ ساعت بعد از قطع آخرین دوز دارو اتفاق می افتد. این علائم شامل: اضطراب، تکان عضلات، لرزش دست و انگشتان، ضعف پیش رونده، سرگیجه، اختلال در ادراک بصری، تهوع، استفراغ، بی خوابی و افت فشار خون وضعیتی.

علائم مازور: این علائم در طی ۱۶ ساعت تا ۵ روز بعد از قطع آخرین دوز دارو اتفاق می افتد و تا حدود ۱۵ روز کاشی می یابد. این علائم شامل: تشنج و آشفته گیروانی.

موارد احتیاط:

فنوباربیتال در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افراد با درد زیاد با احتیاط مصرف شود، زیرا ممکن است باعث تحریک بیمار شود.

-در افراد با اختلال عملکرد کبدی و کلیوی

-در افرادی که سابقه سوء مصرف دارو دارند (مصرف کنندگان مداوم الکل، سوء استفاده از اوبیوئیدها، سایر داروهای خواب آور-آرامش بخش، سوء مصرف آمفتامین)، در افراد با سابقه افسردگی و افکار خودکشی به علت احتمال تحمل و وابستگی روانی و فیزیکی

-در افراد با تب، بالا بودن سطح هورمون تیروئید، دیابت ملیتوس و آنمی شدید

-در بزرگسالان با $ClCr < 10 \text{ ml/min}$ مصرف دارو به هر ۱۶-۱۲ ساعت کاهش یابد.

-در بزرگسالان موقودیاالیز، یک دوز قبل از دیالیز و ۵۰٪ دوز بعد از دیالیز مصرف شود.

-در بزرگسالان با دیالیز صفاکی، ۵۰٪ دوز نرمال مصرف شود.

-در کودکان با $GFR < 10 \text{ ml/min}$ دوز مصرفی به ۵۰٪ دوز معمول کاهش یابد و هر

۲۴ ساعت مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

الکل، کلرامفنیکل، MAOIs (ترانل سپیرومین، ایپوکروساید، فلنزین)، ریفامپین، والپروئیک اسید، هاپارین، وارفارین، ریبواکسایان، بتا بلاکر (آنتولول، بیژوپرولول، متوپرولول، پروپرانولول، سوتالول، تیمولول)، کلرپرومازین، کلونازپام، داروهای ضد بارداری، گورتیکواستروئید، دوکسوروبیسین، داکسی سایکلین، استروژن، گریزئوفلوئین، مترونیدازول، ضد دردهای مخدر (متادون، میریدین و...)، پرازینوکانتل (نابید همزمان مصرف شوند)، کینیدین، رانولازین (نابید همزمان مصرف شوند)، تنوفیلین، وراپامیل،

هر قرص خط دار فنوباربیتال حاوی ۶۰ میلی گرم فنوباربیتال می باشد که در پلیسترای ۱۰ عددی و جعبه های ۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف، داخل هر جعبه تولید و عرضه می شود.

هر قرص خط دار فنوباربیتال حاوی ۱۰۰ میلی گرم فنوباربیتال می باشد که در پلیسترای ۱۰ عددی و جعبه های ۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف، داخل هر جعبه تولید و عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

-آرامش بخش:

بزرگسالان: دوز معمول، ۱۲۰-۳۰۰ میلی گرم روزانه در ۳-۲ دوز منقسم، حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴۰۰ میلی گرم.

کودکان: دوز معمول، ۱۰-۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز، ۳ بار در روز.

-درمان صرع جنرالیزه و پارشیال:

بزرگسالان: درمان نگهدارنده، ۲۰۰-۶۰۰ میلی گرم روزانه با ۱۰۰-۵۰ میلی گرم ۲-۳ بار در روز. دوز نگهدارنده به طور معمول ۱۲ ساعت بعد از لودینگ دوز شروع می شود.

کودکان: دوز معمول، ۶-۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه.

-راهنمای های عمومی:

-این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

-این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی و خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به فنوباربیتال و سایر باربیتورات ها و هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به پورفیری یا تاخیری، اختلال عملکرد کبدی علامت دار، نفريت (التهاب کلیه)، بیماران با مشکلات تنفسی (سختی در تنفس یا انسداد مجاری تنفسی) در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

فنوباربیتال در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود. و فواید مصرف آن در مقابل مضرات آن سنجیده شود.

وریکونازول (نباید همزمان مصرف شوند)، داروهای مهارکننده تیروزین کیتاز (آفاتینیب، بوسوتینیب، ارلوتینیب، ایماتینیب و...) نباید همزمان مصرف شوند.

نحوه صحیح مصرف دارو:

دارو برای جذب بیشتر، بهتر است با معده خالی مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون، خواب آلودگی، افکار غیر عادی، اضطراب، ناهماهنگی عضلات بدن، گیجی، سرگیجه، تب، تهوع، سردرد، اسپاسم و حرکات غیر ارادی عضلات، بی خوابی، کابوس شبانه، اختلالات عاطفی و قویا، افزایش فعالیت در کودکان، بی قراری (در صورت مصرف در هنگام درد)، هذیان، هیجان، پیوست، تهوع، استفراغ، آسیب کبد (در صورت مصرف طولانی مدت)، آنمی مگالوبلاستیک (در صورت مصرف طولانی مدت)، واکنش های افزایش حساسیت (راش پوستی، آنژیوادم، سندرم استیونس-جانسون)، آپنه تنفسی، کاهش حجم تنفس.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان جلال، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۴۱۳-۱۷
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com