

است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا حین مصرف از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

بهتر است این دارو در کودکان و سالمندان (به جز درمان گاستروپارزی دیابتیک) به علت ریسک بروز عوارض اکستروپیرامیدال مصرف نشود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

– در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به متوکلوپرامید یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

– در صورت وجود مشکلات گوارشی خطرناک (انسداد فیزیکی، خونریزی و سوراخ شدگی دستگاه گوارش)

– سابقه جراحی دستگاه گوارش طی ۳-۴ روز گذشته

– بیماری فتوکروموسیتوما (تومور غده آدرنال)

– بیماران با سابقه صرع

– مصرف همزمان با داروهایی که می توانند میزان بروز واکنش های اکستروپیرامیدال را افزایش دهند

من جمله داروهای دسته فنوتیازین

– داشتن سابقه واکنش های دیستونیک به دنبال مصرف متوکلوپرامید

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بهتر است متوکلوپرامید در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها:

از مصرف متوکلوپرامید بیش از ۱۲ هفته خودداری نمایید.

هر ۱ میلی لیتر (۲۵ قطره) از قطره ۱۵ میلی لیتری پلامیدگات® حاوی ۴ میلی گرم متوکلوپرامید هیدروکلراید می باشد که در جعبه های یک عددی همراه با قطره چکان عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ضد تهوع

– درمان گاستروپارزی (فلج معده)

دیابتیک:

بزرگسالان: ۱۰ میلی گرم، ۳۰ دقیقه قبل از هر وعده غذا و قبل از خواب، به مدت ۲-۸ هفته. درمان بیش از ۱۲ هفته توصیه نمی شود. سالمندان: بیش از ۵ میلی گرم در هر دوز مصرف نشود.

– درمان رفلاکس معده-مری:

بزرگسالان: دوز معمول ۱۵-۱۰ میلی گرم تا ۴ بار در روز، ۳۰ دقیقه قبل از هر وعده غذا و قبل از خواب. اگر علائم به طور متناوب ادامه داشت، به جای درمان ادامه دار، می توان ۲۰ میلی گرم قبل از وضعیت تحرکی مصرف نمود. درمان نباید بیش از دو هفته ادامه یابد.

– پیشگیری از تهوع و استفراغ تاخیری

مرتبط با شیمی درمانی و درمان تهوع و استفراغ ناشی از عمل جراحی:

سن	وزن بدن	دوز	تعداد دفعات استفاده
۱-۳ سال	۱۰-۱۴ کیلوگرم	۱ میلی گرم	تا حداکثر ۳ بار در روز
۳-۵ سال	۱۵-۱۹ کیلوگرم	۲ میلی گرم	تا حداکثر ۳ بار در روز
۵-۹ سال	۲۰-۲۹ کیلوگرم	۲/۵ میلی گرم	تا حداکثر ۳ بار در روز
۹-۱۸ سال	۳۰-۶۰ کیلوگرم	۵ میلی گرم	تا حداکثر ۳ بار در روز
۱۵-۱۸ سال	بالای ۶۰ کیلوگرم	۱۰ میلی گرم	تا حداکثر ۳ بار در روز

راهنمایی های عمومی:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده

موارد احتیاط:

متوکلوپیرامید در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در بیماران با سابقه آسم ریوی
- در افراد با سابقه آلرژی آنوپیک
- در افراد با برادی کاردی (کاهش ضربان قلب) و اختلال در هدایت قلب
- در کودکان و سالمندان
- در افراد مبتلا به پارکینسون
- در افراد با اختلال در الکترولیت های خون

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

هیوسین، دی سیکلومین، برومو کریپتین، کابرگولین، آنتی سسایکوتیک (هالوپریدول، دروپریدول و...)، داپسون موضعی، سیکلوسپورین، نیتریک اکساید، لیدو کائین/پرلو کائین، پوساکونازول، پرومتازین، ریواستیگمین، SSRIs (سرترالین، فلوکستین و...)، SNRIs (دلوکستین، و نالفاکسین)، نیترات سدیم، تترابنازین.

نحوه صحیح مصرف دارو:

- دارو را قبل از مصرف با آب، آبمیوه یا آب سیب رقیق کرده و سپس میل نمایید.

- دارو را ۳۰ دقیقه قبل از غذا و قبل از خواب مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض اکستراپیرامیدال به خصوص در افراد ۱۹- ۱۵ سال (واکنش های دیس تونیک حاد، حرکت غیر ارادی اندام ها و سختی در تنفس به علت اسپاسم عضلات حلق)، گلاکتوره (جاری شدن بی اختیار شیر از سینه)، ژنیکوماستی (بزرگ شدن سینه)، هیپرپرولاکتینمی (افزایش ترشح شیر)،

افسردگی، مت هموگلوبینی (به خصوص در افراد با کمبود آنزیم)، G6PD سندرم بدخیم نورولپتیک (افزایش دمای بدن، سختی عضلات، تغییر در سطح هوشیاری و...)، اضطراب، گیجی، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، سختی در تنفس، کاهش یا افزایش فشارخون، دیس کینزی تاخیری (حرکات غیر ارادی زبان، صورت، فک و اندام ها)

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و ظهور علائم مسمومیت (گیجی، خواب آلودگی، عوارض اکستراپیرامیدال شدید، تشنج شدید) سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزد. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مهر ۱۴۰۴