

در صورت مبتلا شدن به اسهال ملایم تا شدید در حین مصرف این دارو، که می تواند به علت اسهال ناشی از کسترییدیوم دیفسیل باشد، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

در صورت ایجاد نوروپاتی شدید همراه با این دارو، آن را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

این دارو ممکن است فشار داخل مغز را افزایش دهد و باعث بروز عوارضی مانند لرزش، بی قراری، تحریک عصبی، برهاریهای ترسناک، بی خوابی، اضطراب، سبکی سر و گیجی گردد. (این عوارض با اولین دوز مصرفی نیز می تواند رخ دهد)

موارد احتیاط مصرف:

سیپروفلوکساسین در موارد ذیل باید با احتیاط مصرف شود:

در افراد با بیماری کبدی و کلیوی

در افراد با سابقه تشنج و اختلالات دستگاه عصبی مرکزی

در بیماران مبتلا به بیماری قلبی

در طول مصرف این دارو جهت جلوگیری از کریستالوری، به میزبان کافی آب مصرف نمایید.

در افراد با سابقه کمبود آنزیم G6PD

تداخل دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع کنید.

تیزایدین، کورتیکواستروئید ها، دیدانازین، دلوکستین، هیدروکسی کلروکین، نمک های آهن، اپورایدین، متوترکسات، سیکلوسپورین، نیمودپین، پنتوکسیلین، فنی توتین، الازازین، پیرفنیدون، سسپیلانفیل، داروهای رقیق کننده خون (مانند وارفارین)، متوکلورامید، پیرومیداز، لیدوکائین، پروپنسید، آگومائین، رومینیرول، زولیدم، کلوزاین، داروهای که فاصله QT را طولانی می کنند من جمله داروهای ضد آریتمی کلاس ۱ و ۳ مانند آمیودارون، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، مارکولید ها و آنتی سایکوتیک ها داروهای آنتی اسید حاوی آلومینوم، منیزیم و مکمل های حاوی کلسیم، آهن، زینک، داروهای سوکرالفت، فسفات پائیند ها مانند سولاور (توصیه می شود در صورت مصرف همزمان سیپروفلوکساسین، این دارو را حداقل ۲ ساعت قبل و یا ۴ ساعت بعد از مصرف سیپروفلوکساسین استفاده نماید)

نحوه صحیح مصرف:

دارو را همراه با بدون غذا و با یک لیوان پر از آب، مصرف نماید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نماید.

نفخ، تهوع، استفراغ، درد شکمی، اسهال، تغییر حس چشایی، کاهش اشتها، سوء هاضمه، افزایش آنزیم ترانس آمیناز، افزایش بیلی روبین، راش پوستی، کهیر و قرمزی، درد در عضلات، درد در نواحی قفسه سینه و کمر، نارسای کلیوی، تب، افزایش آلکالین فسفاتاز، درد در مفاصل، اختلال در خواب، آریته شدن

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد آمحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفظ محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: بهمن ۱۳۹۹

قرص روکش دار خط دار پوریکسیدال حاوی ۷۵۰ میلی گرم سیپروفلوکساسین (به صورت هیپروکلراید) می باشد که در پلیسهتر های ۱۰ عددی و جبهه های ۲۰ عددی همراه با متن راهنمای مصرف دارو توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و عرضه می گردد:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

این دارو ممکن است بر روی زمان واکنش فرد تاثیر گذارد، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

مورد و مقدار مصرف:

مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

درمان عفونت دستگاه تنفسی:

• سینوزیت مزمن تشدید شده و التهاب قسمت میانی گوش: ۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۴-۷ روز

• التهاب قسمت خارجی گوش: ۷۵۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۰-۷ روز

درمان عفونت در استخوان و مفاصل

۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت حداکثر تا ۳ ماه

درمان التهاب باکتریایی مزمن پروستات

۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۶-۴ هفته

درمان اسهال عفونی

۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۵-۷ روز

درمان عفونت ساده دستگاه ادراری

• بزرگسالان: ۵۰۰-۲۵۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۳ روز

• زنان در دوران پری منوپوز (قبل از یائسگی): ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز

درمان عفونت تنفسی ناشی از سپاه زخم

بزرگسالان: ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت برای ۶۰ روز

• عفونت پوست و بافت های نرم

۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۴-۷ روز

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از موارد زیر، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به سیپروفلوکساسین یا سایر فلوروکینولون ها مانند: لووفلوکساسین، جمی فلوکساسین و ...

در صورت مصرف تیزایدین همراه با این دارو

در افراد با سابقه پارگی تاندون در صورت مصرف فلوروکینولون ها

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر طبق نظر پزشک معالج.

هشدارها:

در طول درمان با سیپروفلوکساسین، از قرار گرفتن مستقیم یا غیر مستقیم در برابر نور آفتاب یا لامپ های UV به مدت طولانی پرهیزید.

در صورت بروز درد و التهاب در دست، شانه و یا پا دارو را قطع کرده و به پزشک اطلاع دهید.

در صورت بروز واکنش های حساسیتی (انسداد دستگاه تنفسی، کوتاه شدن تنفس، آنژیوادم) کاهش سطح هوشیاری، تشنج، واکنش های پوستی (کهیر و ...) به پزشک مراجعه کنید.

در افراد دیابتی و یا بیماران که داروهای کاهنده قند خون مصرف می کنند، در طول درمان با سیپروفلوکساسین، باید به طور مرتب قند خون کنترل شود.

در صورت بروز علائم نارسای کبد (التهاب کبد، افزایش آنزیم های ترانس آمیناز کبدی و آلکالین فسفاتاز، کلسیاتیک و براقان و زردی و تیره شدن ادرار) دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

