



هنگام مصرف این دارو از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمایید. در صورت باردار شدن در حین مصرف دارو، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.

شیردهی: مطالعات مشخصی راجع به ترشح این دارو در شیر انسان وجود ندارد. به دلیل احتمال عوارض جانبی در نوزاد شیرخوار، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

#### هشدارها:

- مصرف این دارو در افراد کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی شود.
- در صورت نیاز به عمل جراحی، مصرف دارو باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از آن با نظر پزشک قطع گردد.
- این دارو ریسک خونریزی را افزایش می دهد، لذا در حین مصرف باید به نشانه های خونریزی توجه شود.

#### موارد احتیاط:

ریوراکسaban در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در افراد با بیماری های کلیوی و کلیوی
- در افراد با فشار خون بالا

#### تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید: مصرف همزمان با داروهای کلیدیوگرل، پراسرگل، دایکاتران، وارفارین، انوکسaban، ویتامین K، هپارین، ریتوناویر، اینتراکونازول، وریکونازول، کونکونازول، پوساکونازول، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (اسپیرین، ناپروکسن، ایبوپروفن، دیکلوفناک و...)، فنی توبین، کارامازپام، فنوباریتال، گیاه علف چای، ریفاکسیم، اریترومایسین، کلاریترومایسین. نحوه صحیح مصرف دارو: قرص های ۱۵ و ۲۰ میلی گرم باید همراه غذا مصرف شود.

#### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

خونریزی در قسمت های مختلف بدن، مشکلات گوارشی (درد شکمی، تهوع، اسهال، یبوست)، تب، درد و تورم اندام، راش پوستی، سردرد، گیجی، کاهش فشار خون (خصوصاً هنگام تغییر وضعیت)، کاهش عملکرد کلیه، کاهش تعداد گلبول های قرمز خون، افزایش آنزیم های کبدی.

#### مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

#### شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فانتسلا ب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ای امتحان آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: ۱۴۰۳

هر قرص روکش دار ریوراکسaban حاوی ۱۵ میلی گرم ریوراکسaban می باشد. که در ۳ لیستر ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی، همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

هر قرص روکش دار ریوراکسaban حاوی ۲۰ میلی گرم ریوراکسaban می باشد. که در ۳ لیستر ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی، همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

#### موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو در افراد بزرگسال به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ضد ترومبوز (مهار فاکتور Xa انعقاد خون)

فیبرینولاسیون هلیزی غیر دریچه ای: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز همراه با وعده شام.

در افراد با کلیترانس کراتینین ml/min ۱۵-۵۰: ۱۵ میلی گرم یک بار در روز همراه با وعده شام.

در افراد با کلیترانس کراتینین کمتر از ml/min ۱۵، مصرف نشود.

- درمان اخته های خونی در وریدهای ساق (ترومبوز ورید عمقی) و انسداد جریان خون روی (آمبولی روی): در ابتدا ۱۵ میلی گرم دو بار در روز همراه با غذا برای ۲۱ روز؛ سپس درمان با ۲۰ میلی گرم یک بار در روز همراه با وعده شام ادامه می یابد.

- پیشگیری از تشکیل مجدد لخته های خون در عروق خونی ساقی یا ورید بعد از گذشت ۶ ماه از درمان: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز همراه با غذا.

- پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی به دنبال عمل جراحی تعویض مفصل ران یا زانو: دوز اولیه: ۱۰ میلی گرم یک بار در روز (دوز اولیه باید حداقل ۶-۱۰ ساعت قبل از عمل جراحی مصرف شود). که این دوز باید به طور میانگین ۱۴-۱۰ روز و حداکثر ۳۵ روز مصرف شود. در افراد با کلیترانس کراتینین زیر، ml/min ۳۰ مصرف نشود.

#### راهنمای های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه این به دیگران، خودداری نمایید.

- در صورت قراموش کردن یک دوز از دارو به محض یادآوری دوز قراموش شده را مصرف نمایید. اگر ۱۵ میلی گرم دو بار در روز مصرف می کنید می توانید دوز قراموش شده را با دوز بعدی یعنی ۳۰ میلی گرم به صورت یک جا مصرف نمایید و دوباره در روزهای بعد به صورت دو بار در روز مصرف نمایید.

#### موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به ریوراکسaban یا هر یک از اجزای دارو
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی متوسط تا شدید یا هر اختلال کبدی که باعث اختلال در انعقاد خون می شود.
- خون ریزی شدید

- ابتلا به بیماری یا شرایطی خاص در یک اندام که ریسک خونریزی های جدی را افزایش می دهد (زخم معده، جراحی یا خونریزی مغزی، سابقه جراحی اخیر مغز یا چشم ها)

- مصرف همزمان با داروهای جلوگیری کننده از لخته خون (مانند وارفارین، دایکاتران یا هپارین)، مگر زمانی که درمان با داروهای ضد انعقاد در حال تغییر است و در آن شرایطی که هپارین به منظور باز نگهداشتن ورید و یا شرایط دریافت می گردد.

- در صورت بارداری یا شیردهی

#### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بارداری: از مصرف این دارو در دوران بارداری خودداری نمایید. در صورت شناس بارداری در

ATW.103/LF.01/P