

سرلیکس® ۱۰٪ لیدوکائین

اسپری سرلیکس® با حجم های ۵۰، ۱۰۰ میلی لیتر حاوی ۱۰ میلی گرم لیدوکائین در هر ۱ دوز (پاف) می باشد که در جعبه های یک عددی همراه با پایپ اسپری و متن راهنمای مندرج داخل جعبه عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:
برای مهار رفلکس حلقی به منظور معاینات دندانپزشکی، اعمال جراحی دهان، اندوسکوپی یا لوله گذاری در نای بزرگسالان: تا ۲۰ دوز
برای ایجاد بی حسی در غشاهای مخاطی برای دندانپزشکی بزرگسالان: ۵-۱ دوز

راهنمای های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- از مصرف این دارو در نواحی وسیعی از پوست یا مخاط (به خصوص در صورت آسیب دیدگی و نیز از مصرف طولانی مدت آن بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- از مصرف بیشتر از ۲۰ دوز خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
- در صورت وجود حساسیت به لیدوکائین، سایر بی حس کننده های موضعی یا هر یک از اجزای دارو
- در صورت وجود حساسیت به PABA و پارابن
- در صورت وجود عفونت موضعی، اختلالات شدید پوستی یا آسیب مخاطی وسیع
- در صورت ابتلا به مت هموگلوبینمی

- در کودکان زیر ۱ سال که داروهای مصرف می کنند که موجب مت هموگلوبینمی می شود (متوکلورامید، کوتریمو کسازول، دایسون و...)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و فقط زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد.

هشدار ها:

از تماس دارو با چشم ها خودداری نمایید.

- در صورت عدم بهبود یا بدتر شدن بیماری، وجود عفونت در موضع یا بروز خارش و سایر علائمی که از قبل وجود نداشته اند، مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک یا دندانپزشک مشورت نمایید.
- از استنشاق دارو خودداری نمایید. افشانه را در انتهای گلو به کار نبرید مگر آن که پزشک یا دندان پزشک توصیه کرده باشد.
- تا یک ساعت بعد از مصرف دارو در دهان یا گلو از خوردن غذا خودداری کنید، زیرا ممکن است موجب اختلال در بلع شده و به آسیب رسیدن غذا در نای منجر شود.

موارد احتیاط:

- در کودکان مبتلا به G6PD زیر نظر پزشک مصرف شود.
- در افراد مبتلا به اختلال عملکرد کبدی، افراد مسن و کودکان با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
آمیودارون، مگزولین، آپریتانت، دفراسیروکس، دیزیپرامید، پگ اینترفرون آلفا 2b، اتنولول، پروپرانولول، متوپرولول، فوزیدیک اسید، سدیم نیتريت

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

واکنش های حساسیتی (شوک آنافیلاکسی، برونکواسپاسم، درماتیت تماسی، ادم، شوک، کهیر، تورم صورت و دهان و زبان، تورم دست و انگشتان پا، سختی در تنفس، خارش و قرمزی

پوست)، اکته و لگاریس، کم رنگ شدن پوست در موضع درمان، راش ماکوپاولا، کاهش فشار خون، خواب آلودگی، عصبی شدن، احساس گیجی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج، کاهش ضربان قلبی

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و یخ زدگی نگهداری نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی تهران-ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۴۰۰



داروسازی خوارزمی
Khazarm
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلالی
پن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۸۵۵۵۶۱۳۱-۱۷
کدپستی: ۱۳۹۷۱۵۵۱۳
info@khazarmpharm.com - www.khazarmpharm.com