

هر قرص روکشدار سیتاگلیپتین حاوی ۲۵ میلی گرم سیتاگلیپتین (به صورت مونوهیدرات) می باشد که در ۳ پلیستر ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود. هر قرص روکشدار خط دار سیتاگلیپتین حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین (به صورت مونوهیدرات) می باشد که در ۳ پلیستر ۱۰ عددی و در جعبه های ۳۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: ضد دیابت
درمان دیابت نوع دو: ۱۰۰ میلی گرم، یک بار در روز.

راهنمای های عمومی:

- این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
حساسیت شدید به سیتاگلیپتین یا هر یک از اجزای دارو.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بهرتر است در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود.

هشدارها:

سیتاگلیپتین بهتر است در افراد زیر ۱۸ سال مصرف نشود.
در حین مصرف دارو از نوشیدن الکل و فراورده های الکلی خودداری کنید.
اگر در حین مصرف دارو علائم پانکراتیت (درد شدید مداوم شکمی) بروز کرد، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.
مصرف این دارو ممکن است در بعضی از افراد باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با ماشین آلات دقیق، خودداری کنید.

احتیاط های مصرف:

سیتاگلیپتین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:
- در بیماران با دیابت نوع یک و دیابت کنتاودیوز
- در مصرف همزمان با انسولین
- در سوختگی، تب، عفونت، جراحی و تروما
- در بیماران با انسداد دستگاه گوارش و اسهال
- در بیماران با التهاب حاد پانکراس
- در بیماران با نارسایی کلیه و دیالیزی
- در بیماران با نارسایی و اختلال شدید عملکرد کبدی
- در بیماران با نارسایی قلبی
- در بیماران مبتلا به درد مفاصل

تداخل های دارویی:

دیگوکسین، کورتیکواستروئیدها (بامتانازون، دکزامتازون، پردنیزولون و ...)، سوماتروپین، هیدروکلروتیازید، وازازان، کلاریترومایسین، تستوسترون، آتازانایر، اتنولول، نیکوتینیک اسید (نیاسین)، نیتروگلیسرین، کارودیلیلول، کلروکسین، کلونیدین، سیپروفلوکساسین، سیکلوسپورین، دانازول، دیووپرایمید، فلوکستین، ایندیناویر، لانتانول، لوفلوکساسین، لینزولاید، لیتنوم، ریتوناویر، لوزارتان، متوکلوپرایمید، متوپرولول، ترانیل سیپرومین، فلیکزین، ایزوکروپوکسازید، موکسی فلوکساسین، ناندرولون، داناسوت، اکتروتاید، اولوکساسین، اکسی متولون، پنتوکسی فیلین، پروپرانولول، کاپتوپریل، لیزیناپریل، اتالپریل، سوتالول، تاکرولیموس، الکل، گارلیک (سیر)، جای سبز

نحوه صحیح مصرف دارو:

سیتاگلیپتین می تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود. جهت کاهش عوارض گوارشی، بهتر است دارو بعد از غذا مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

التهاب پانکراس، درماتیت خفیف، آنژدادم، سندرم استیونس-جانسون، نارسایی کلیوی، نارسایی قلبی، شوک آنافیلاکسی، ادم محیطی، کاهش قند خون، بیوست، راش پوستی، بالا رفتن آنزیم های کبدی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، التهاب گلو، سردرد، اسهال، درد شکمی، تهوع، استفراغ، کپهر، درد ماهیچه، درد مفاصل، درد کمر، کاهش اشتها، التهاب رگ های پوستی، خشکی دهان، خواب آلودگی، گیجی، اختلالات نعوظ.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز مسمومیت سریعاً به پزشک و بیمارستان مسمومین مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه ی سانتیگراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزد. در مورد نحوه ی آمحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج - شهرک استقلال
خیابان جلال، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی: ۱۳۸۹۲۱۶۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۳۳۵۶۵۶۱۲-۱۷۰
www.kharazmipharm.com - info@kharazmipharm.com