

ولوتیل® استامینوفن

هر ۱ میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی ولوتیل® حاوی ۱۰۰ میلی گرم استامینوفن، می باشد که در جبهه های یک عددی به همراه یک قطره چکان و متن راهنمای محصول، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری غلغلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- * وجود هر گونه حساسیت
 - * بارداری و یا شیردهی
 - * استفاده از سایر داروها
 - * ابتلا به بیماری های دیگر
- در صورت بروز موارد زیر در حین مصرف استامینوفن، مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید:

بدر شدن علائم بیمار و یا به وجود آمدن علائم جدید

وجود تورم یا قرمزی در موضع درد

ادامه تب پس از ۳ روز از مصرف دارو

ادامه درد پس از ۱۰ روز از مصرف دارو در بزرگسالان، ۵ روز در کودکان، و ۳ روز در نوزادان که کودکانی که جهت درمان کلودر استامینوفن استفاده می کنند، در صورتی که کلودر در دسترس است، به مدت بیشتر از ۴ روز طول کشیده است یا همراه با تب، راش پوستی، سردرد، تهوع و استفراغ است.

موارد و مقدار مصرف دارو:

کاهش درد و تب:

جدول مقدار دوز دارو بر اساس وزن و سن کودک در زیر آمده است. بهتر است جهت تعیین دوز صحیح، وزن کودک ملاک قرار داده شود.

دوز دارو بر حسب نیاز می تواند هر ۴ ساعت (حداکثر تا ۵ بار در روز) تکرار شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان، سن، وزن و شرایط بدنی، سایر داروهایی که مصرف می نماید، تعیین می شود. به منظور کاهش عوارض گوارشی بهتر است با غذا مصرف شود.

دوز پیشنهادی در هر وعده:

سن	وزن	مقدار دارو در هر وعده
کودکان تا ۴ ماه	۵/۴ تا ۸/۱ کیلوگرم	۸۰ میلی گرم
کودکان ۴ تا ۱۱ سال	۸/۲ تا ۱۰/۸ کیلوگرم	۱۲۰ میلی گرم
کودکان ۱۲ تا ۳ سال	۱۰/۹ تا ۱۶/۳ کیلوگرم	۱۶۰ میلی گرم
کودکان ۴ تا ۵ سال	۱۶/۴ تا ۲۱/۷ کیلوگرم	۲۴۰ میلی گرم
کودکان ۶ تا ۸ سال	۲۱/۸ تا ۲۷/۲ کیلوگرم	۳۲۰ میلی گرم

قبل از مصرف شیشه را به خوبی تکان دهید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن

در صورت وجود هر گونه حساسیت به استامینوفن یا هر یک از اجزای دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

استامینوفن را در دوران بارداری و شیردهی تحت نظر پزشک می توان مصرف کرد.

هشدارها:

ماکزیمم دوز روزانه مصرف استامینوفن ۴ گرم می باشد که بیش از این مقدار موجب سمیت کبدی می شود. مصرف روزانه استامینوفن در طولانی مدت باعث آسیب کبدی در برخی افراد می گردد.

در صورت بروز هر گونه واکنش حساسیتی پوستی شدید دارو را سریعاً قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید. در صورت مصرف همزمان استامینوفن و کولستریرامین، کولستریرامین را حداقل یک ساعت بعد از مصرف استامینوفن مصرف کنید.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تجویز شده بلافاصله به پزشک یا بیمارستان سمومشن مراجعه نمایید. همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن مصرف نشود. در کودکان زیر ۳ سال با نظر پزشک مصرف شود.

موارد احتیاط:

در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

در بیماران مبتلا به کبد الکلی که بیشتر از ۳ لیوان روزی الکل مصرف میکنند به علت افزایش احتمال آسیب کبدی

در افراد با اختلال عملکرد کبدی

در افراد با اختلال کلیوی شدید با تنظیم دوز می تواند تجویز شود.

در افراد دچار کمبود آنزیم G6PD

در افراد مبتلا به سوء تغذیه مزمن

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

الکل، باربیتوراتها (مانند فنوباریتال و پریمیدون)، بوسلفان، کاربامازپین، کلستریرامین، بی حسی های موضعی، دیاسون (موضعی)، داساتپیت، فوس فنی توئین، فنی توئین، ایمانتین، ایزونیازید، لاموتریزین، متیراپون، میمرسون، نیتریک اکساید، پرنوسید، فیل افرین، پریلوکائین، سدیم نیترات، سورافیتب، اتانگوپستهای ویتامین K (وارفارین)

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موارد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

واکنشهای حساسیتی، کبودت ادرار، راش پوستی، کاهش سطح سرمی بی کربنات، کاهش سطح سرمی سدیم و کلسیم، افزایش سطح آمونیاک و کلر خون، افزایش اوریک اسید در خون، افزایش سطح سرمی گلوکز، اُسمی، نوتروپنی، کاهش تعداد نوتروفیلها، لوکوپنی (کاهش گلبولهای سفید خون)، پان سایتونی، افزایش سطح سرمی آلکالین فسفاتاز و بیلی روبین، نفروتوکیسیسی

شرایط نگهداری:

دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از ذخیره زنگی محافظت نماید.

دارو را بسته بندی اصلی خود خارج نکند.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نماید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزد. در مورد نحوه امحاء یا در کنار داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفظ محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اردیبهشت ۱۴۰۲