

ORAL DROPS[®] TOPVIT[®] MULTIVITAMINS



هر ۱ میلی لیتر (۲۵ قطره) از قطره ۱۵ میلی لیتری تاپ ویت[®] حاوی ۱۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین A پالمیتات، ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین D3 (کوله کلسیفرول)، ۵ واحد بین المللی ویتامین E استات، ۰/۵ میلی گرم ویتامین B1 (تیامین)، ۰/۶ میلی گرم ویتامین B2 (ریبوفلاوین)، ۰/۴ میلی گرم ویتامین B6 (پیریدوکسین)، ۸ میلی گرم ویتامین B3 (نیاسین آمید)، ۱/۵ میکروگرم ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)، ۳۵ میلی گرم ویتامین C (آسکوربیک اسید)، ۱/۸ میلی گرم ویتامین B5 (دکسپنتول)، ۸ میکروگرم ویتامین B7 (بیوتین) و فولیک اسید ۰/۱ میلی گرم که در جعبه های یک عددی همراه با قطره چکان عرضه می شود.

مورد مصرف:

کمک به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین های مورد نیاز بدن

موارد مصرف:

ویتامین A: رتینول در بینایی، رشد، تمایز بافت اپیتلیال و نیز نگهداری غشاهای مخاطی چشم، پوست، دهان، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری ضروری است.
ویتامین D3: کوله کلسیفرول در کنترل جذب کلسیم رژیم غذایی از روده و بازجذب کلسیم از کلیه ضروری است.

ویتامین E: توکوفرول یک ویتامین محلول در چربی است که دارای خواص آنتی اکسیدانی است. ویتامین E اجزا تشکیل دهنده سلول را از اکسیداسیون محافظت کرده و از تشکیل محصولات اکسیداسیونی سمی جلوگیری می کند. کمک به حفظ پیوستگی دیواره گلبول های قرمز می کند و گلبول های قرمز را از همولیز حفظ کرده و از تجمع پلاکت ها جلوگیری می کند.

ویتامین C: آسکوربیک اسید یک ویتامین محلول در آب با خواص آنتی اکسیدانی است که به عنوان یک کوآنزیم ضروری برای تشکیل کلاژن، ترمیم بافت، سنتز لیپید و پروتئین است و به عنوان یک آنتی اکسیدان برای بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی (متابولیسم آهن و فولیک اسید، افزایش مقاومت به عفونت و حفظ یکپارچگی دیواره عروق) ضروری است.

ویتامین B1: تیامین یک ویتامین محلول در آب است که اثرات اولیه آن شامل: متابولیسم کربوهیدرات ها، حفظ رشد طبیعی، انتقال تکانه های عصبی و سنتز استیل کولین است. تیامین برای متابولیسم هوازی طبیعی ضروری است.

ویتامین B2: ریبوفلاوین یک ویتامین محلول در آب با اثرات آنتی اکسیدانی است. ویتامین B6: پیریدوکسین یک ویتامین محلول در آب است که به عنوان یک کوآنزیم برای متابولیسم آمینواسید، گلیکوژن، کربوهیدرات، چربی و پروتئین ها است. پیریدوکسین کمک به سنتز هموگلوبین و افزایش مقدار اکسیژن حمل شده توسط هموگلوبین می کند. پیریدوکسین با تبدیل کربوهیدرات و سایر قندها به گلوکز به نرمال نگه داشتن سطح گلوکز خون کمک می کند. پیریدوکسین همچنین کمک به تقویت سیستم ایمنی، سیستم عصبی و بهبود خلق و خوی می کند.

ویتامین B12: سیانوکوبالامین کمک به رشد و تولید سلول ها، سنتز گلبول های قرمز و سنتز میلین (سلول های حفاظتی از نورون) می کند. مقدار مصرف: مقدار مصرف هر فرآورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است:

نوزادان و کودکان زیر ۲ سال روزانه ۱ میلی لیتر یا طبق نظر پزشک مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

– در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ویتامین ها یا هر یک از اجزای فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

– در صورت ابتلا به اختلالات کبدی، زخم فعال معده، سندرم سو: جذب و کاهش عملکرد کلیه در مورد مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

– در صورت هیپرویتامینوز A و D (وجود مقادیر زیاد ویتامین در بدن)، هیپرکلسمی (بالا بودن مقدار کلسیم در خون)، هیپرفسفاتمی (بالا بودن مقدار فسفات در خون).

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

موارد احتیاط:

این فرآورده در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:
- در افراد با نارسایی مزمن کلیوی
- در نوزادان نارس
- در افراد مبتلا به دیابت، نقرس و بیماری های کبدی
- در افرادی که داروهای لوودوپا و فنی توفین مصرف می کنند.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

اورلیستات (این فرآورده دو ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف اورلیستات مصرف شود)، آریپیپرازول، اورلیستات (این فرآورده دو ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف اورلیستات مصرف شود)، آریپیپرازول، نمک های کلسیم، دیگوکسین، دانازول، سوکرالفیت، هیدروکلروتیازید، کلرامفنیکل، کلشی سین، آتورواستاتین، رزواستاتین، سیمواستاتین، لوودوپا، فنی توفین، وارفارین.

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

این فرآورده را همراه با غذا و یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
خشک شدن مخاط، التهاب قریه، آلوپسی، درماتیت صورت (درگیری غشاهای مخاط و پوست)، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکمی، سوزش سر دل، اختلال عملکرد کبدی در دوزهای بالا، راه رفتن نامتعادل، بی حسی انگشتان، کاهش حس لامسه، کاهش دمای بدن، لرزش بدن، واکنش های حساسیت به نور، ناهماهنگی عضلات بدن، احتمال زرد رنگ تر شدن ادرار، احساس گرمی، خارش، کهیر، ضعف بدن، تعریق، بی قراری، سیانوز، ادم ریه، خونریزی داخل معده، کلایپس قلبی-عروقی و شوک آنافیلاکتیک.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم زیر سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

علائم هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز ویتامین D3: سردرد، تهوع، استفراغ، گیجی، درد شکمی، درد استخوان، پلی اوری (زیاد شدن ادرار)، ضعف، آریتمی قلبی، رسوب کلسیم در بافت های نرم، کلسمی اوری (دفع کلسیم از ادرار).

شرایط نگهداری:

- فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.


- فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: مهر ۱۴۰۲



ATW.057/LF.0

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال
این بسمت داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۹۷۶۵۱۲ تلفن: ۲۲۵۵۴۱۲-۱۷
info@kharazmipharma.com www.kharazmipharma.com

شرکت داروسازی
خوارزمی