

هر قرص روکشدار خط دار تافکس سیدال® حاوی ۵۰۰ میلی گرم لووفلوکسازین است، که در جعبه های ۵ عددی (۱ پلیستر ۵ عددی) همراه با برگه راهنمای مصرف، داخل هر جعبه تولید و عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: آنتی بیوتیک (فلوروکینولون ها)

- **سینوزیت حاد باکتریایی:** ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۴-۱۰ روز.

- **عفونت دستگاه ادراری:** ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۴-۷ روز.

- **پنومونی اکتسابی از جامعه:** ۵۰۰ میلی گرم ۱-۲ بار در روز برای ۱۴-۷ روز.

- **برونشیت حاد مزمن:** ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۰-۷ روز.

- **عفونت دستگاه ادراری بدون عارضه:** ۲۵۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۳-۷ روز.

- **التهاب باکتریایی مزمن پروستات:** ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۲۸ روز.

- **عفونت پوستی عارضه دارو بافت نرم:** ۵۰۰ میلی گرم ۱-۲ بار در روز برای ۱۴-۷ روز.

- **پنومونی اکتسابی از بیمارستان:** ۷۵۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۱۴-۷ روز.

- **درمان یا پیشگیری سیاه زخم:** ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز برای ۸ هفته.

راهنمای های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی، منگی، خواب آلودگی یا کاهش سطح هوشیاری گردد. لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود حساسیت نسبت به لووفلوکسازین و یا سایر فلوروکینولون ها (سیپروفلوکسازین ، افلوکسازین و ...) و هر یک از اجزای دارو

- در بیماران با طولانی بودن فاصله QT قلب (آریتمی)

- در بیماران که سابقه التهاب یا پارگی تاندون ناشی از فلوروکینولون ها را دارند.

- در افراد با سابقه میاستینی گراویس

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی پیشنهاد نمی شود مگر زیر نظر پزشک معالج.

هشدارها:

- لووفلوکسازین، ممکن است باعث درد، التهاب، یا پارگی تاندون شود. در صورت مشاهده این علائم در دست ها، شانه ها و ساق پا، مصرف دارو را قطع نموده و سریعاً به پزشک مراجعه فرمایید.

- در طول درمان با لووفلوکسازین از قرار گرفتن مستقیم یا غیر مستقیم در برابر نور

آفتاب یا لامپ های خورشیدی به مدت طولانی بپرهیزید و در صورت بروز علائم سمیت نوری (آفتاب سوختگی شدید، قرمزی پوست، خارش یا ادم) سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

- لووفلوکسازین ممکن است باعث درد، التهاب، یا پارگی تاندون شود. در صورت مشاهده این علائم در دست ها، شانه ها و ساق پا، مصرف دارو را قطع نموده و سریعاً به پزشک مراجعه فرمایید. ریسک پارگی تاندون در افراد بالای ۶۰ سال، افرادی که داروهای کورتیکواستروئید مصرف می کنند و افرادی که پیوند کلیه، قلب و ریه شده اند بیشتر است.

- در صورت بروز واکنش های حساسیتی (انسداد دستگاه تنفسی، کوتاه شدن تنفس، آنژیوادم)، کاهش سطح هوشیاری، تشنج، واکنش های پوستی (کهیر و...) و سایر علائم حساسیت به دارو، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- در افراد دیابتی و یا بیماران که داروهای کاهنده قند خون مصرف می کنند، در طول درمان با لووفلوکسازین، باید به طور مرتب قند خون کنترل شود. زیرا این دارو اثرات داروهای کاهنده قند خون را افزایش داده و باعث افت بیشتر قند خون می شود. حتی ممکن است باعث افزایش قند خون شود.

- در طول مصرف دارو اگر دچار نوروپاتی شدید، دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

- در صورت مبتلا شدن به اسهال ملایم تا شدید در حین مصرف این دارو، که می تواند به علت اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل باشد، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- از مصرف همزمان داروهای ضد اسید معده حاوی آلومینیوم، منیزیم و مکمل های حاوی آهن، روی، کلسیم با لووفلوکسازین بپرهیزید. لووفلوکسازین را حداقل ۲ ساعت قبل یا بعد از مصرف این فرآورده با مصرف نمایید.

موارد احتیاط:

لووفلوکسازین در افراد زیر با احتیاط و زیر نظر پزشک متخصص مصرف شود:

- در بیماران مبتلا به دیابت که داروهای کاهش دهنده قند خون مصرف می کنند.

- در بیماران با سابقه بیماری های اعصاب و روان

- کودکان، سالمندان و زنان باردار و شیرده

- در افراد با بیماری های کبدی و کلیوی

- در بیماران با سابقه تشنج و صرع و افرادی که داروهایی مصرف می کنند که آستانه شروع تشنج را کم می کند و مصرف همزمان با داروهای NSAIDs (ایبوپروفن، دیکلوفناک و...)

- در افراد بالای ۶۰ سال ، کودکان، بیماران که داروهای کورتیکواستروئید مصرف می کنند، بیماران پیوندی و بیماران با سابقه آرتريت روماتوئید

-در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی (سابقه طولانی بودن فاصله QT قلب و آریتمی) و مایستنی گراوین

تداخل های دارویی:

آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم، واکسن BCG داخل مثانه (از مصرف همزمان بپرهیزید، دیدناوزین، نمک های آهن، واکسن تیفوئید، وارنیکلین، وارفارین، نمک های زینک (به جز زینک کلراید)، انداسترون، نمک های منیزیم، داروهای افزایش دهنده فاصله QT قلب (دیزوپیرامید، پروکائین آمید، کینیدین، سوتالول، کلر پرومازین، سیتالوپرام، کلاریترومایسین، اریترومایسین، فلوکستین، پیموزاید، تیوریدازین)، NSAIDs (ایبوپروفن، دیکلوفناک و...)، پرونسیسد، سولامر(لوفلوکساسین حداقل ۲ ساعت قبل تا ۶ ساعت بعد از مصرف سولامر مصرف شود)، سوکرالفیت (لوفلوکساسین حداقل ۲ ساعت قبل تا ۶ ساعت بعد از مصرف سوکرالفیت مصرف شود)، داروهای کاهنده قند خون، نمک های کلسیم (به جز کلسیم کلراید)، کورتیکواستروئیدها (بانتازون، دگزامتازون و ...).

نحوه صحیح مصرف دارو:

-قرص را می توان همراه یا بدون غذا مصرف کرد. در صورت بروز عارضه گوارشی بهتر است با غذا مصرف شود.

-دارو را با یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

سر درد، گیجی، خستگی، خواب آلودگی، بی خوابی، تشنج، خارش، راش پوستی، خواب رفتگی اندام ها، خواب های غیرعادی، تهوع، اسهال، استفراغ، درد و کرامپ شکمی، خشکی دهان، سوزش سر دل، بیوسنت، نفخ، کولیت سودوممبران، اختلال عملکرد کبد و کلیه، التهاب واژن، افزایش یا کاهش فشار خون، اختلال ضربان قلب، سنکوپ، آریتمی، ادم، تب، لوکوپنی (کاهش تعداد گلبول های سفید خون)، لوکوسیتوز (افزایش تعداد گلبول های سفید خون، کاهش یا افزایش قند خون، لرزش بدن، وزوز گوش، رابدومیولیز و التهاب تاندون، افزایش یا کاهش پتاسیم خون.

مسمومیت:

در صورت مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۳۹۸



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، ۹ کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
خیابان طبل، پلاک ۱۱۵ صندوق پستی: ۱۳۹۷۱۶۶۳۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۱۷
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com