کپسول

امنیلوس® ۰/۴

تامسولوسین پیوسته رهش

Capsule

Omnilose® 0.4

Extended Release Tamsulosin

هر عدد کپسول خوراکی پیوسته رهش حاوی تامسولوسین هیدروکلراید ۰/۴ میلی گرم(معادل ۰/۳۶۷ میلی گرم تامسولوسین) به عنوان ماده موثر دارویی می باشد که در بلیستر ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی به همراه متن راهنمای محصول، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید :

وجود هر گونه حساسیت　　بارداری و یا شیردهی

استفاده از سایر داروها　　ابتلا به بیماری های دیگر

موارد مصرف:

این دارو جهت درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) و بهبود جریان ادرار، درمان علایم انسداد و اختلال عملکرد خروجی مثانه مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه ی مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهایی که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان: روزانه ۱ کپسول که باید بعد از صبحانه یا اولین وعده غذایی، در ساعت معینی در روز مصرف شود.

کپسول را به طور کامل بلعیده و از بازکردن، جویدن و یا خرد کردن محتویات خودداری نمایید.

چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. ولی اگر به نوبت بعدی نزدیک بود.

از مصرف آن خودداری نمایید و از دو برابر کردن دوز مصرف بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری نمایید. و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید.

موارد منع مصرف:

درصورت حساسیت به هریک از اجزای دارو از مصرف آن خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی منوط به تجویز پزشک می باشد.

موارد احتیاط و هشدارها

قبل از مصرف این دارو در صورت ابتلا به هر بیماری دیگری به خصوص اختلالات کلیوی و کبد، بیماری های قلبی و گردش خون با پزشک خود مشورت نمایید.

اگر به دلیل آب مروارید یا افزایش فشار چشم تحت عمل جراحی چشم باید قرار بگیرید، لطفاً به متخصص چشم خود اطلاع دهید که از تامسولوسین استفاده می کنید یا قبلاً از آن استفاده کرده اید. زیرا ممکن است حین عمل جراحی این دارو عوارض جانبی ایجاد نماید.(سندروم فلاپ‌ی عنبیه)

مصرف این دارو در کودکان یا نوجوانان کمتر از ۱۸ سال به دلیل نبودن اطلاعات کافی، توصیه نمی شود.

از قطع این دارو بدون مشورت با پزشک متخصص خودداری نمایید.

این دارو ممکن است باعث ایجاد احساس ضعف و سرگیجه شود باید تا زمان از بین رفتن این علائم نشسته یا دراز بکشید و همچنین ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

-انجام معاینات دوره ای جهت بررسی پیشرفت بهبودی بیمار در حین مصرف این دارو ضروری می باشد.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولاتی که استفاده می کنید(از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) تهیه نمایید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع، متوقف یا تغییر ندهید.

وارفارین، داروهای کاهنده فشار خون (مانند: وراپامیل یا دیلتیازم)، داروهای درمان عفونت قارچی (مانند: کتوکونازول یا ایتراکونازول)، مسدود کننده های دیگر آلفا (مانند: دکسازوسین، پرازوسین، ایندورامین، آلفوزوسین) ، اریترومایسین، کلاریترومایسین، کاربامازپین، فنی توئین، ریفامپین، فنوباربیتال، نیکوراندیل، سیلدنافیل، تادالافیل، نیفیدیپین، پنتوکسی فیلین، لوودوپا

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

عوارض جانبی شایع:

انزال غیر طبیعی، سرگیجه، کاهش فشار خون وضعیتی، علائم حساسیت، سندروم فلاپی عنبیه همراه با علائمی چون انقباض مردمک، شل شدگی، بیرون زدگی عنبیه

سایر عوارض جانبی:

احساس افزایش ضربان قلب، سردرد، کمر درد، اسهال، یبوست، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، ضعف غیرعادی، راش پوستی، خارش، درد قفسه سینه، کاهش میل جنسی، اختلال در خواب، غش یا سبکی سر بخصوص در هنگام برخاستن، خواب آلودگی، حالت تهوع.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اسفند ۱۴۰۰

داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جبالل،
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۱۷-۴۴۵۴۵۴۱۳-۰۲۱ کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com