

# محلول خوراکی تنوزین® تنوفیلین - جی

هر پیمانه (۵ میلی لیتر) از محلول خوراکی ۱۲۰ میلی لیتری تنوزین® حاوی ۵۰ میلی گرم تنوفیلین انهدروس و ۳۰ میلی گرم گایافنزین می باشد، که در جمیع های یک عددی همراه با پیمانه و برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

## موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

## دسته دارویی: کشاد کننده برونش -خلط آور

## درمان آسم مزمن:

کودکان ۸-۱ سال: ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

کودکان ۱۱-۱۶ سال: ۱۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

کودکان ۱۷-۱۲ سال: ۱۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

بزرگسالان سالم و غیر سیگاری: ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

بزرگسالان سالم و سیگاری: ۱۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز منقسم.

## موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

-در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به گزانتین ها مثل تنوفیلین و یا حساسیت به گایافنزین با پزشک خود مشورت نمایید.

-در صورت ابتلا به بیماری های زخم معده و اختلالات تشنج (مگر در صورت دریافت داروی ضد صرع) در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

## هشدارها:

-دوز این دارو در بیماران کبدی باید کاهش یابد.

-مقدار مصرف تنوفیلین را باید برای هر فرد با توجه به شرایط او به طور جداگانه تنظیم نمود و غلظت سرمی دارو، به خصوص در درمان طولانی مدت، پیگیری شود.

طی درمان با این دارو، از مصرف مقادیر زیاد فرآورده ها یا نوشابه های حاوی گزانتین (کافئین، قهوه، چای) اجتناب نمایید.

## موارد احتیاط:

تنوفیلین جی در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افراد با زخم معده

-در افراد با بیماری های قلبی (نارسایی احتقانی قلب) و کبدی

-در افراد با کمبود اکسیژن خون

-در بیماران با افزایش فشار خون

-در افرادی که الکل مصرف می کنند

-در نوزادان و سالمندان (به خصوص مردان)

## تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید:

باربیتورات ها، زغال فعال، کتوکتازول، ریفامپین، نیکوتین (سیگار)، فورمتورول، سالیتامول، سالمترول، کاربامازپین، ایزونیازید، فوروزماید، آلوپورینول، سایمتیدین، داروهای ضد بارداری خوراکی، گورتیکواستروئیدها (بناستازون، دگزامتازون و...)، دی سولفیرام، واکسن و ویروس آنفلوانزا، اینترفرون، ماکرولیدها (آزیترومایسین، اریترومایسین، کلاریترومایسین)، کینولون ها (سپروفلوکساسین، لوفلوکساسین و...)، هورمون های تیروئید (لووتیروکسین و...)، بنزدیازپین ها (آلپرازولام، کلونازپام و...)، لیتیم، پروپوفول، کتامین، رانیتیدین، تتراسایکلین ها (داکسی سیکلین، تتراسایکلین، مینوسایکلین)، کافئین.

## نحوه صحیح مصرف دارو:

دارو باید با معده خالی، همراه با یک لیوان آب مصرف شود تا جذب آن افزایش یابد.

در صورت بروز تحریک گوارشی، دارو همراه با غذا یا بافاصله پس از آن مصرف شود.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید: آرتمی، تحریک سیستم عصبی مرکزی، تشنج، اسهال، التهاب معده، سردرد، بی خوابی، تهوع، افزایش ضربان قلب، استفراغ، هیپوکالمی (کاهش پتاسیم خون).

## مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم زیر سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

استفراغ، بی قراری، افزایش ضربان قلب، افزایش قند خون، تشنج، هیپوکالمی شدید (کاهش سطح پتاسیم خون).

## شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از بخی زدی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را در دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق قاضیالاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

## ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

## تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۳۹۷