

هر قرص روکشدار خط دار تیوریدازین ۱۰ حاوی ۱۰ میلی گرم تیوریدازین هیدروکلراید می باشد که در پلیسترهای ۲۰ عددی و جبهه های ۱۰۰۰ عددی همراه با متن راهنمای مصرف، تولید و عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری های عصبی تشنجی تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تبوه بن به دیگران خودداری نمایید.

نحوه و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

این دارو را همراه با یک لیوان آب و بعد از غذا مصرف نمایید.

درمان اسکیزوفرنی:

بزرگسالان: دوز معمول ۸۰۰-۳۰۰۰ میلی گرم در ۲-۴ دوز منقسم. دوز ابتدایی به صورت ۱۰۰-۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز می باشد که با توجه به پاسخ و تحمل بیمار می تواند افزایش یابد. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۸۰۰ میلی گرم.
کودکان بالای ۱۵ سال: دوز ابتدایی به صورت ۵/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه ۲-۴ دوز منقسم می باشد که با توجه به پاسخ و تحمل بیمار می تواند افزایش یابد. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید: در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به تیوریدازین یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به بیماری های قلبی (افزایش یا کاهش شدید فشار خون)، کما، در بیماران یا سابقه اریتمی قلبی و دیسریوس شدید دستگاه عصبی مرکزی در مورد مصرف این دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت مصرف تیوریدازین با داروهای طولانی کتنده فاصله QT قلب و داروهای مهار کننده CYP 2D6 (مثل فلوکستین و پاروکستین) فلوکسامین و پروپرانولول در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

بارداری و شیردهی:

تیوریدازین در دوران بارداری باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
این دارو می تواند در شیر مادر ترشح شود، مصرف تیوریدازین در دوران شیردهی باید زیر نظر پزشک و با نظر گرفتن مزیت مصرف دارو به عدم مصرف صورت گیرد.

هشدارها:

این دارو ممکن است در برخی افراد باعث خواب آلودگی و تاری دید گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
از مصرف این دارو در کودکان یا بیماری های حاد (مثل ابله مرغان، عفونت دستگاه عصبی مرکزی، سرخ و گاستروارتریت) و یا در کودکانی که آب بدن خون را از دست داده اند به دلیل حساس بودن به عوارض عضلانی این دارو به خصوص در نوزاد خودداری شود.
مصرف تیوریدازین می تواند باعث سندرم تورلوریک بدخیم (NMS) شود پس حتما طی درمان بیمار را از نظر بروز عوارضی مثل تب، تغییرات ذهنی، سختی عضلات بررسی نماید. ریسک NMS در بیماران با پارکینسون و دمانس و فراموشی بیشتر است.
در طی مصرف دارو، احتمال افت فشار خون وضعیتی همراه با سرگیجه، افزایش ضربان قلب و سرگیجه وجود دارد.
این دارو می تواند سطح پروتکترین را افزایش دهد پس بیمار باید در طی درمان از این نظر آزرینایی شود.

در ابتدای درمان و طی درمان با تیوریدازین تعداد گلبول های سفید خون و الکترولیت ها بررسی شود.

دارو را نباید به صورت ناگهانی قطع نماید، بلکه باید زیر نظر پزشک و به تدریج در طی ۲-۴ هفته قطع شود.

اگر در حین مصرف دارو، واکنش های ازباید حساسیت (آنژیوادم، کاهش فشار خون، تکی کاری (افزایش ضربان قلب)، تورم زبان، سختی در تنفس و راش پوستی و آنفالیاسی) رخ داد، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

موارد احتیاط:

تیوریدازین در افراد زیر احتیاط مصرف شود:

در افراد با سابقه بیماری های قلبی (مثل بالا یا پایین بودن فشار خون، اریتمی، سکته مغزی، سابقه بیماری های عروق مغزی، سابقه جریب خون، بیماریار دیابتی یا مبتلا به هر گونه اختلال قند خون، افراد با اختلالات تنفسی به علت عفونت های حاد یا مزمن تنفسی (آسم یا آمفیزم روی)، افراد با ریسک آپیراسیون (به خصوص در افراد دچار آتزیمر)، افراد با سابقه گلوکوم، افراد با ریسک تشنج و سرخه به سر، افراد با اختلال عملکرد کبدی و کلیوی، بیمارار دچار دمانس و سالمنان بالای ۷۵ سال

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از استفاده زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید: مهار کننده های استیل کولین استراز (دونیپزیل، لانتانین، ممانتین، ریواسستگمین، الکک و فرآورده های حاوی الکک، افتامین، فسد دردهای اپیوپنید اکثین، پوپروئوفین، هیدروکلون، ترامادول)، آنتی اسیدها، کلروکین، پروپاتیلین، دی سکولومین، آگونیست دوپامین (روپینرول، پرامی پکسول، برومورکرتین، لودودیا)، آریپیرازول، آتوموکستین، زالانتین (بینی)، پروپرانولول، برومونییدین، کلرفنیرامین، دایوکستین، دوکسورویسین، دوکسیلامین، فلوکستین، فلوکسامین، گلوکاکون، اپیراتزیوم (استنشاقی)، ایوآرآدن، منیزیم سولفات، متیل فنییدت، متوکلوپرامید، متوپرولول، مگلوامید، ینگ افترنول 2bاید، پیوماید، پاسبیم کلراید، سکرین، تن کسکیتین، تالیداماید، هیدرو کلروتیازید، کلرپرومازین، کلوزاین، هالوپریدول، تیوتیروپیوم، تیوپرامات، زولید، آمودارون

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در درک دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا دروساز خود مشورت نمائید:

تغییرات ECG قلب، کاهش فشار خون، طولانی شدن فاصله QT قلب، تحریک پذیری، آکازی (بی قراری و حس نیاز به حرکت اندام ها)، آکینزی (کاهش توانایی حرکت اندام ها)، ریه های غریز، غریز غایب، خواب آلودگی، بی خوابی، دیس تونی، هیجان، دیس کینزی زخیری، لرزش، اریتم، تغییرات اثرات پوست، اشیائینی، سیوسیت، اسهال، خشکی دهان، استفراغ، افزایش وزن، آموره، اختلال نعوظ، کاهش کالکوره (خروج شیر از پستان)، زینک شون پستان، اختلال در چرخه قاعدگی، اگر آلوسیتوز، انمی، انمی آلیستیک، نعوظ دردناک، احتیاس آدراری، لوکوپنی، زوموسیتونی، سنگ کیسه صفرا، پرقان، ادم، سختی عضلات، آسم، احتقان بینی، تنگ شدن مردمک چشم، تاری دید، تب، افزایش دمای بدن، دیس کینزی تاخیری، تیری گریه قریه چشم، اختلالات جنسی، سرگیجه و سردرد.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نماید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نماید. دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نماید.

هیچ فرآورده ای دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزد. در مورد نحوه ایامه آن با دکتر یا دروساز مشورت نماید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۰



داروسازی خوارزمی
Khazrazi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پلاک ۱۵
پست داروسازی خوارزمی، تهران
تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۵۴۱۳-۱۳
کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۵۱۳
info@khazrazipharma.com - www.khazrazipharma.com