

مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک خود افزایش ندهید.
 در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی، هیپاتیت و سایر بیماری های کبدی و فیل کتونوری در صورت مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
 از مصرف همزمان این فرآورده با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید.
 در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار مجاز به اولین مراکز درمانی مراجعه کنید.
 در بیماران با سابقه سوء مصرف الکل مصرف نشود.
 چنانچه بیش از روز دوز دارای گلو درد هستید که همراه تب، سردرد، تهوع و راش پوستی است از مصرف دارو خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید.

تداخلات دارویی:

قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید:
 مصرف استامینوفن همراه با باریتوراک، زغال فعال، آلکل، فنی توتین، ایزوتیازید، لاموتریزین، وارفارین و دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی (خصوصاً آسپرین) توصیه نمی شود.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

با مصرف دوزهای بالای استامینوفن مواردی از گیجی، سردرگمی و هیجانات زیاد دیده شده است. گزارشاتی مبنی بر نوتروپنی، پان سیستونی و ترومبوسیتونی با مصرف استامینوفن موجود است.

افزایش آنزیم های کبدی در موارد نادر مشاهده شده است، راش پوستی و آسیب کلیوی ممکن است با مصرف استامینوفن مشاهده شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
 - دارو را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
 هیچ فرآورده ای دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید.
 در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت کد داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
 تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آذر ۱۴۰۰

قرص خوراکی خط دار ولوتیل® ۳۲۵، حاوی ۳۲۵ میلی گرم از ماده موثره استامینوفن می باشد. که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- * وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی
- * استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهای که مصرف می نمایند، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بهتر است، به منظور کاهش تحریکات گوارشی این دارو را همراه با غذا و مایعات مانند شیر مصرف گردد.

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال:

روزانه ۳ تا ۴ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت، حداکثر مقدار مصرف ۴ گرم در روز می باشد.

کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال:

روزانه ۳ تا ۴ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت، نباید میزان مقدار مصرف از ۱/۶۲۵ گرم در روز بیشتر شود و حداکثر مدت زمان استفاده از این محصول با مقدار مصرف ذکر شده، ۵ روز می باشد.

افزایش دوز مصرفی فقط با دستور پزشک معالج امکان پذیر است.

کودکان کمتر از ۶ سال:

مقدار و نحوه مصرف این محصول باید توسط پزشک معالج تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به استامینوفن

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوزهای درمانی در دوران بارداری صدماتی به جنین وارد نمیکند. مصرف دوزهای بالا به صورت مداوم ممکن است در مادر ایجاد کم خونی کند و جنین نیز با مشکلات کلیوی روبرو می شود.

استامینوفن به مقدار خیلی کم در شیر ترشح می شود ولی عوارض جانبی در نوزادان شیرخوار مشاهده نشده است. بنابراین مصرف این محصول طی دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد.

موارد احتیاط و هشدارها:

چنانچه بوی تبک از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. ولی اگر به نوبت بعدی نزدیک بود از مصرف آن خودداری نمایید و از توبرابر کردن مقدار نوبت بعدی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید و به صورت معمول نوبت بعدی را سر وعده مصرف کنید.

