

ولوتیل®

استامینوفن

هر ۱ میلی لیتر (۲۵ قطره) از قطره ولوتیل، حاوی ۱۰۰ میلی گرم استامینوفن می باشد، که در جعبه های یک عددی همراه با قطره چکان عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

نوزادان زیر ۳ ماه		کودکان ۳ تا ۱۱ ساله	
۴۰ میلی گرم (۱۰ قطره)	هر ۶ ساعت	۸۰ میلی گرم (۲۰ قطره)	حداکثر ۵ بار در روز
۱۲۰ میلی گرم (۳۰ قطره)	هر ۶ ساعت	۱۶۰ میلی گرم (۴۰ قطره)	حداکثر ۵ بار در روز
۲۴۰ میلی گرم (۶۰ قطره)	هر ۶ ساعت	۳۲۰ میلی گرم (۸۰ قطره)	حداکثر ۵ بار در روز

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید. در صورت بروز موارد زیر در حین مصرف استامینوفن، مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید:
-بدر شدن علائم بیمار و یا به وجود آمدن علائم جدید
-تورم و قرمزی در نواحی مختلف بدن
-ادامه تب پس از ۳ روز از مصرف دارو
-ادامه درد پس از ۱۰ روز از مصرف دارو در بزرگسالان، ۵ روز در کودکان و ۳ روز در نوزادان
-در کودکانی که جهت درمان کلورد استامینوفن مصرف می کنند، باقی ماندن کلورد کدک برای بیش از ۲ روز همراه با تب، قرمزی، سردرد، تهوع و استفراغ

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید: در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به استامینوفن یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید. در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

استامینوفن را در دوران بارداری و شیردهی تحت نظر پزشک می توان مصرف کرد.

هشدارها:

-ماکزیم دوز روزانه مصرف استامینوفن، ۴ گرم می باشد که بیش از این مقدار باعث سمیت کبدی و آسیب به کبد می شود.

-در صورت بروز هر گونه واکنش حساسیتی پوستی شدید در حین مصرف استامینوفن، سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

-در صورت مصرف همزمان استامینوفن و کولستریرامین، کولستریرامین را حداقل یک ساعت بعد از مصرف استامینوفن مصرف کنید.

موارد احتیاط:

در کودکان زیر ۳ سال زیر نظر پزشک مصرف شود. استامینوفن در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افرادی که بیشتر از ۳ ماه الکل مصرف می کنند به علت ریسک تخریب کبدی

-در افراد دچار کمبود آنزیم G6PD

-در افراد با اختلال سوء جذب مزمن

-در افراد با اختلال کلیوی شدید، با احتیاط و با تنظیم دوز می تواند مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

باربیتورات ها (فنتوربیتال، پیریمیدون)، پروپنسید، الکل، بوسلفان، کاربامازپین، کولستریرامین، دایسون (موضعی)، ایزونازید، لاموتریزین، ایمانتینیب، نیتروک اکسیاید، فنیل آفرین، لینو کائین ایلرلو کائین، وارفارین.

نحوه صحیح مصرف دارو:

برای کاهش عوارض گوارشی بهتر است با غذا مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

راش پوستی، کاهش سطح سرمی بیکرنات، کاهش سطح سرمی کلسیم و سدیم، افزایش آمونیم و کتر خون، افزایش بیلی روبین و آنکالین فسفاتاز خون، انمی، لوکونی (کاهش گلبول های سفید خون)، ترومبوسیتونی (کاهش پلاکت های خون)، افزایش اوره در ادرار، افزایش گلوکز خون.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
- دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.
- دارو را در دور دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال، پست بند داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۱۷-۱۳۹۱۶۱۵۴
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com