

هر ۵ میلی لیتر از محلول خوراکی ولوتیل® حاوی ۱۲۰ میلی گرم استامینوفن می باشد، که توسط شرکت داروسازی خوارزمی و در بسته بندی یک عددی به همراه راهنمای مصرف دارو در بازار عرضه می شود.

راهنمای های عمومی:

این فرآورده برای بیماری قلبی شفا تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز اطلاع رسانی نمایید.

• وجود هر گونه حساسیت به دارو

• بارداری و یا شیردهی

• استفاده از سایر داروها

• ابتلا به بیماری های دیگر

نحوه و مقدار مصرف:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

کاهش درد و تب:
نوزادان زیر ۳ ماه: ۴۰ میلی گرم (۱/۵ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۳-۱۱ ماه: ۸۰ میلی گرم (۲/۵ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۱۲-۳۰ سال: ۱۲۰ میلی گرم (۵ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۳-۱۲ سال: ۱۶۰ میلی گرم (۶/۵ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۱۳-۲۴۰ میلی گرم (۱۰ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۲۴-۳۰ سال: ۲۴۰ میلی گرم (۱۰ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۳۱-۶۰ سال: ۳۲۰ میلی گرم (۱۳ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۶۱-۹۰ سال: ۴۰۰ میلی گرم (۱۶/۵ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

کودکان ۹۱-۱۲۰ سال: ۴۸۰ میلی گرم (۲۰ میلی لیتر)، هر ۶ ساعت، حداکثر ۵ بار در روز

بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۶۵۰ میلی گرم، هر ۶-۴ ساعت، ماکزیمم دوز روزانه ۴ گرم.

برای کاهش عوارض گوارشی بهتر است با غذا و آب مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده از پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به استامینوفن.

در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

استامینوفن را در دوران بارداری و شیردهی تحت نظر پزشک می توان مصرف کرد.

هشدارها:

در صورت بروز موارد زیر در حین مصرف استامینوفن، مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید:

-درد شدن عارضه بیمار و یا به وجود آمدن علائم جدید

-تورم و قرمزی در نواحی مختلف بدن

-ادامه تب پس از ۳ روز از مصرف دارو

-ادامه درد پس از ۱۰ روز از مصرف دارو در بزرگسالان، ۵ روز در کودکان و ۳ روز در نوزادان

-در کودکانی که جهت درمان کلودرد استامینوفن مصرف می کنند، باقی ماندن کلودرد کودک برای بیش از ۲ روز همراه با تب، قرمزی، سردرد، تهوع و استفراغ

-ماکزیمم دوز روزانه مصرف استامینوفن، ۴ گرم می باشد که بیش از این مقدار باعث سمیت کبدی و آسیب به کبد می شود.

-در صورت بروز هر گونه واکنش حساسیتی پوستی شدید در حین مصرف استامینوفن، سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

-در صورت مصرف استامینوفن و کولستریمین، کولستریمین را حداقل یک ساعت بعد از مصرف استامینوفن مصرف کنید.

موارد احتیاط:

در کودکان زیر ۳ سال زیر نظر پزشک مصرف شود.

-در افرادی که بیشتر از ۳ ماه الکل مصرف می کنند به علت ریسک تخریب کبدی

-در افراد G6PD

-در افراد با اختلال سوء جذب مزمن

-در افراد با اختلال کلیوی شدید، با احتیاط و با تنظیم دوز می تواند مصرف شود.

-در افراد با اختلال عملکرد کبدی

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

باربیتورات ها (فنوباریتال، پریمیدون، پروپیلیدون، الکل، بوسلفان، کاربامازین، کولستریمین، دایسون (موضعی)، ایزونیازید، لاموتریزین، ایمپاتینیب، نیتریک اکساید، فینل افرین، لیدو کائین، پرلیوکالین، وارفارین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

راش پوستی، کاهش سطح سرمی بیکربنات، کاهش سطح سرمی کلسیم و سدیم، افزایش آمونیه و کلر خون، افزایش بیلی روبین و اکتالین فسفاتاز خون، اتمی، لوکوپنی (کاهش گلبول های سفید خون)، ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت های خون)، افزایش لوره در ادرار، افزایش گلوکز خون.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق قاضیالاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه اِمْحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: دی ۱۴۰۰