



ونلافاکسین ۷۵

Venlafaxine 75



هر کپسول آهسته رهش ونلافاکسین حاوی ۷۵ میلی گرم ونلافاکسین (به صورت هیدروکلراید) می باشد که در صورت پلیسه‌تراهی ۱۰ عددی و در جمیع های ۴۰ عددی، همراه با پرگه راهمانی مصرف تولید و عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: ضد افسردگی (SNRIs)

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

- **درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی منتشر:** ۷۵-۳۷/۵ میلی گرم روزانه، که با توجه به شدت بیماری و پاسخ بیمار به دارو می توان هر ۷-۴ روز به میزان ۷۵ میلی گرم دوز را افزایش داد. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۲۲۵ میلی گرم.

- **درمان اختلالات پانیک:** ۳۷/۵ میلی گرم یک بار در روز برای ۷ روز، سپس در صورت تحمل بیمار می توان هر ۷ روز ۷۵ میلی گرم دوز را افزایش داد. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۲۲۵ میلی گرم.

راهنمای های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نماید.
- مصرف این دارو برای افراد کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی شود.
- از مصرف همزمان این دارو با نوشیدنی های حاوی الکل خودداری نماید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به ونلافاکسین و یا هر یک از اجزای دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت مصرف همزمان با داروهای MAOIs (ترانزین سیرومین، فنلزین) و تا ۲ هفته بعد از قطع مصرف MAOIs و یا در صورت مصرف همزمان با لینزولید با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو نباید در دوران بارداری مصرف شود، مگر زیر نظر پزشک معالج.
این دارو در شیر مادر می شود، لذا مصرف آن در دوران شیردهی باید زیر نظر پزشک صورت گیرد.

هشدارها:

- در طول درمان با ونلافاکسین، به طور منظم، فشار خون خود را کنترل نمایید.
- در طول درمان طولانی مدت با دارو، سطح سرمی کلستریل خون را کنترل نمایید.
- در صورت مصرف همزمان داروهای MAOIs (سازیلین، ایزوکربوگسازید، ترانزین سیرومین، فنلزین) با این دارو، می بایست ۱۴ روز قبل از شروع ونلافاکسین، مصرف این داروها را قطع کرده و دوباره ۷ روز بعد از قطع این داروها، می توان مصرف ونلافاکسین را شروع کرد. قطع دارو باید حتماً زیر نظر پزشک متخصص صورت گیرد.
- از قطع ناگهانی ونلافاکسین پرهیز نمایید و فقط زیر نظر پزشک اقدام به قطع آن نمایید.
- قطع ناگهانی در طی سه روز باعث بروز علائم ترک دارو (خستگی، خواب آلودگی، سردرد، تهوع، استفراغ، بی اشتها، بی گنجی، خشکی دهان، اسهال، اختلالات خواب، بی قراری، اضطراب، عصبی شدن، به خواب رفتن، اندام ها، تعرق زیاد و سرگیجه) می شود.

موارد احتیاط:

ونلافاکسین در افراد زیر با احتیاط و زیر نظر پزشک معالج مصرف شود:

- در افراد با ریسک سکنه قلبی یا افزایش ضربان قلب
- در بیماران با اختلالات کبدی و کلیوی
- بیماران با سابقه صرع
- بیماران با سابقه مانی
- بیماران با اختلالات خون ریزی دهنده
- بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته و افزایش فشار داخل چشم
- در افراد با ریسک شکستگی استخوان

تداخل های دارویی:

NSAIDs (ناپروپروفن، دیکلوفناک، اسپیرین، ناپروکسن و...)، وارفارین، دایگاتران، گیاه علف چای، کدوکتین، میرتازپین، MAOIs (فنلزین، ترانزین سیرومین، ایزوکربوگسازید، سزلیزین)، هالوپریدول، آموکسیتین، دایوکسیتین، سوماترپتان، اینتیم، فنتانیل، کتوکونازول، سیمیتیدین، ترامادول، کلوزاپین، هالوپریدول، ایندیناویر، پروپرانولول، ترازودن، SSRIs (فلوکسیتین، سرتالین، فلووکسامین، اس سیتالوپرام، سیتالوپرام، پاروکسیتین، الکل و فرآورده های حاوی الکل، ریزواروکسامین، ای نفرین، نوراپی نفرین، تیزانیدین، کلونیدین، متیل دپا، اندانسترون، بوستنان، اسپیرین، آریپیپرازول، اپریپانت، دفراسیروس، ویتامین B_۶، وریکونازول، پیموزاید، پروپوفن، بنتوکسین، فیلین، پگ اینترنرفن آلفا ۲b، آکاتا ۳، متوکلوپرامید، لینزولید، هیدروکدون، متیلن بلو، بوسپیرون، دنوکسی کولیک اسید، گلوکز آمین، گیاه آلفا و آنیسون.

نحوه مصرف دارو:

ونلافاکسین با همراه با غذا مصرف نمایند.

عوارض جانبی:

هر در صورت به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
خواب و رویای غیرعادی، بی اشتها، اضطراب، تغییر در سطح کلستریل خون، گیجی، بیوست، سردرد، افزایش فشار خون، بی خوابی، اختلالات قاعدگی، تهوع و استفراغ، اختلالات جنسی، گشاد شدن عروق، اختلالات بینایی، تغییر در وزن بدن، التهاب کبد، افزایش پرولاکتین، گجلی و پریش، خونریزی دستگاه گوارش، اسهال، حساسیت به نور، افت فشار خون و وضعیتی، راش پوستی، اختلالات حس چشایی، احتیاس ادرار، صرع، وزوز گوش، سرگیجه، تپش قلب، خواب آلودگی، سفتی عضلات، دندان قروچه.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فضا یا زباله های خانگی دور نریزد. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران - کیومرث ۱۰ کیلومتر ۱ جاده مخصوص کرج - شهرک استلال
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۱۷
فکس: ۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۱۷
پست الکترونیک: info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com