

هر ۵ میلی لیتر از شربت ویتابی پلاس (شربت ب کمپلکس + ال-لیزین) حاوی موارد ذیل می باشد:

۵ میلی گرم	تیامین هیدروکلراید (ویتامین B ₁)
۲ میلی گرم	ریبوفلاوین سدیم ۵ فسفات (ویتامین B ₂)
۲۰ میلی گرم	نیاسین آمید (ویتامین B ₃)
۳ میلی گرم	پانتوتنیک اسید (ویتامین B ₅)
۲ میلی گرم	پیریدوکسین هیدروکلراید (ویتامین B ₆)
۱/۵ میکروگرم	سیانوکوبالامین (ویتامین B ₁₂)
۱۵۰ میکروگرم	فولیک اسید
۱۰۰ میلی گرم	ال-لیزین هیدروکلراید

شربت ویتابی پلاس توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و داخل جعبه به همراه ۱ بروشور به بازار عرضه می شود.

موارد مصرف:

- مکمل غذایی برای کمک به درمان بی اشتهایی و همچنین در دوران نقاهت برای تمام گروه های سنی، ال-لیزین: افزایش دهنده جذب کلسیم توسط بدن و استخوان ها و کمک به جلوگیری از دفع آن از طریق ادرار.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر فرآورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است:
 کودکان: روزانه ۵ میلی لیتر (۱ قاشق مرباخوری)
 بزرگسالان: روزانه ۱۵ میلی لیتر (۳ قاشق مرباخوری)

موارد منع مصرف:

- در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
 - در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ویتامین ها یا هر یک از اجزای فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.
 - در صورت ابتلا به اختلالات کبدی، زخم فعال معده و عدم تحمل فرآورده در مورد مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی فقط زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

موارد احتیاط:

این فرآورده در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افراد مبتلا به دیابت، نقرس و بیماری های کبدی
-در افرادی که داروهای لوودوپا و فنی توئین مصرف می کنند.
-در افراد با آنمی پرنیشیوز (نوعی کم خونی مگالوبلاستیک است که علت آن یک واکنش خودایمنی علیه سلول های دیواره معده است که برای جذب ویتامین B₁₂ ضروری هستند).

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
نمک های کلسیم، کلرامفنیکل، کلشی سین، اتورواستاتین، رزواستاتین، سیمواستاتین، لوودوپا، فنی توئین، چای سبز، فنوباریتال، پریمیدون، سولفاسالازین.

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

از آنجا که کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست به طور معمول ترکیبی از این ویتامینها تجویز می شود.

در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف فرآورده، به دلیل اینکه زمان زیادی برای تخلیه ویتامین لازم است، مصرف نوبت فراموش شده ضروری نمی باشد.
قبل از مصرف خوب تکان دهید.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته گردد در صورت بروز هریک از علائم زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

از علائم زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- حالت تهوع یا flushing که معمولا به طور موقت ظاهر می شود و در صورت مصرف مداوم این حالت از بین می روند.

- بروز واکنشهای آلرژیک شدید که به ندرت رخ می دهند این واکنشها شامل جوش، خارش، تورم به خصوص بر روی صورت، زبان، گلو، گیجی، مشکلات تنفسی می باشند.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده های دارویی را از طریق فاضلاب ها زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: مهر ۱۴۰۴