

موارد احتیاط:

- از مصرف بیشتر از میزان توصیه شده روزانه مکمل پرهیز شود.
- مکمل ها نباید جایگزین یک رژیم متنوع و متعادل و سبک زندگی سالم شوند.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک معالج خود را مطلع سازید:

تریتونین یا ایزوتریتونین، آنتی اسیدها، آنتی بیوتیکها، مدرها، داروهای ضد فشار خون، داروهای سولفیدی، پنیسیلیمین، داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (مثل: ایبوپروفن، ناپروکسن، سلکوکسیب، دیکلوفناک، ایندومتاسین، ملوکسیکام و غیره).

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

ناراحتی معده، سردرد، طعم بد یا غیرمتعارف در دهان.

شرایط نگهداری:

این فرآورده را در جای خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اسفند ۱۴۰۱

این فرآورده به شکل کپسول خوراکی حاوی ۳۰۰ میلی گرم ویتامین ث و ۱۰ میلی گرم روی می باشد، که در شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

راهنمای عمومی:

قبل از مصرف مکمل موارد ذیل را به پزشک معالج و یا

داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- * وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی * استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر
- * اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد مصرف:

این محصول آنتی اکسیدان است و به سلامت پوست، مو، ناخن و سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

مقدار و نحوه مصرف:

- بزرگسالان: روزانه ۱ عدد کپسول با آب، ترجیحاً همراه با وعده غذایی میل شود.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به ویتامین ها یا هر یک از اجزای فرآورده از مصرف این فرآورده خودداری کنید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با پزشک معالج مشورت شود.

هشدارها:

- این دارو را با شیر، سایر لبنیات، مکمل های کلسیم یا آنتی اسیدها حاوی کلسیم مصرف نکنید.

- در صورت بروز علائم واکنش آلرژیک مانند کهیر؛ مشکل در تنفس؛ تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو، بیمار میبایست به اورژانس پزشکی مراجعه کند.