# آسیکلوویر ۴۰۰
# Aciclovir 400

هر قرص از این دارو، حاوی ۴۰۰ میلی گرم آسیکلوویر می باشد که در بلیستر های ۱۰ عددی و جعبه های ۶۰عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

**راهنمای عمومی:**

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

*وجود هر گونه حساسیت *بارداری و یا شیردهی
*استفاده از سایر داروها *ابتلا به بیماری های دیگر

**دسته دارویی:**

ضد ویروس

**مکانیسم اثر:**

آسیکلوویر و متابولیت های آن مانع ساخت محتوای ژنتیکی ویروس شده و از تکثیر ویروس جلوگیری می کنند.

**موارد و مقدار مصرف دارو:**

**بزرگسالان:**

**هربس زوستر(زونا)**

۸۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در زمان بیداری ( ۵ بار در روز) به مدت ۷ روز (در صورت بروز اولین علائم درمان آغاز می شود، اثر بخش ترین زمان درمان در طی ۷۲ ساعت ابتدایی شروع علائم می باشد).

**هربس سیمپلکس (تبخال) دستگاه تناسلی:**

۲۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در زمان بیداری ( ۵ بار در روز) به مدت ۱۰-۷ روز

-در بیماران با ایمنوز های عود مجدد بیماری:

۲۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۵ روز

(بهترین زمان شروع درمان، در طی ۲۴ ساعت ابتدایی شروع علائم می باشد).

-سرکوب مزمن بیماری در صورت عود های مکرر و شدید:

۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۲ ماه

**واریسلا (آبله مرغان):**

-بهترین زمان شروع درمان، در طی ۲۴ ساعت ابتدایی شروع علائم می باشد.

ممکن است در بیماران با ارجاع های فعال، درمان دیرتر آغاز شود.

۸۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در زمان بیداری (۵ بار در روز) به مدت ۷-۵ روز و تا زمان بهبودی زخم ها

**تبخال دهانی:**

۴۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۱۰-۵ روز تا رفع تمامی زخم ها (بهتر است درمان با شروع اولین علائم بیماری آغاز گردد).

**کودکان:**

**پیشگیری از عفونت ویروسی سایتومگال:**

-نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۴۰ کیلو گرم: ۴۰۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع بدن در هر دوز به صورت ۴ بار در روز (حداکثر دوز مجاز مصرفی: ۸۰۰ میلی گرم در هر دوز می باشد).

-کودکان و نوجوانان بیش از ۴۰ کیلو گرم: ۸۰۰ میلی گرم ۴ بار در روز

**هربس زوستر**

درمان سرپایی

کودکان بالای ۱۲ سال و نوجوانان: ۸۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت ( ۵ بار در روز) به مدت ۷-۵ روز

**نحوه مصرف:**

دارو را با مقدار زیاد آب یا مایعات میل نمایید.

آسیکلوویر را میتوان همراه و یا بدون غذا مصرف نمود.

در صورتی که مصرف یک دوز از دارو را فراموش کرده اید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید. در صورت فرا رسیدن زمان دوز بعدی، دارو را طبق برنامه مصرف نمایید و از دو برابر کردن مقدار مصرفی جهت جبران دوز از یاد رفته، خودداری نمایید.

**موارد منع مصرف:**

-در صورت حساسیت به آسیکلوویر

**هشدار ها:**

-در بیماران با نارسایی شدید کبدی با احتیاط مصرف گردد.

-آسیکلوویر ممکن است با ایجاد کریستال در مجاری ادراری موجب آسیب حاد کلیوی از جمله بروز نفروپاتی انسدادی، نفریت بینابینی و نکروز توبولار کلیوی گردد.

- آسیب کلیوی در اکثر موارد پس از کاهش دوز و یا قطع دارو رفع می گردد.

-آسیکلوویر می تواند موجب اختلال در سیستم عصبی و بروز علائمی مانند گیجی، بی قراری و اضطراب، بی حالی، توهم و اختلالات شناختی شود.

-میکرو آنژیوپاتی ترومبوتیک (بروز لخته در عروق کوچک خونی):

این عارضه شامل ترومبوتیک ترومبوسیتوپنی پورپوره و سندرم اورمیک همولیتیک می باشد.این عوارض می توانند موجب آسیب به مغز، کلیه، کبد، پانکراس و قلب شوند.با قطع دارو درمانی و درمان حمایتی مناسب، علائم بهبود میابند.

این عارضه شامل ترمبوتیک ترمبوسیتوپنی پورپوره و سندرم اورمیک همولیتیک می باشد.این عوارض می توانند موجب آسیب به مغز، کلیه، کبد، پانکراس و قلب

شوند. با قطع دارو درمانی و درمان حمایتی مناسب، علائم بهبود میابند.

-در کودکان سالم مبتلا به بیماری وارپسلا، مصرف خوراکی آسیکلوویر توصیه نمی شود. اما ممکن است در بیماران دارای ریسک متوسط تا شدیدا دچار کودکان بالای ۱۲ سال، وجود اختلال ریوی و مزمن پوستی، مصرف طولانی مدت سالیسیلات) در صورت ابتلا به این عفونت، آسیکلوویر تجویز می گردد.

-در صورت ضعف سیستم ایمنی مانند ابتلا به بیماری HIV و یا پیوند مغز استخوان قبل از مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

**احتیاطات مصرف:**

**این دارو در بیماران زیر با احتیاط مصرف گردد:**

-افراد بالای ۶۵ سال

-در بیماران با فشار خون بالا

-بیماران دارای مشکلات کلیوی در حال حاضر

-بیماران با وزن بالا

-بیماران دیابتی

- بیماران دریافت کننده دوز های بالا آسیکلوویر

-در صورت مصرف همزمان با داروهایی مانند دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی، ونکومایسین و...

**بارداری:**

این دارو از جفت عبور می کند و در دوران بارداری سازگار است. بر اساس مطالعات انجام شده، آسیکلوویر در ۳ ماهه ابتدایی بارداری موجب آسیب به جنین نمی شود.

آسیکلوویر برای درمان تبخال دستگاه تناسلی و آبله مرغان در زنان باردار مورد استفاده قرار می گیرد.

عفونت اولیه ویروس هربس سیمپلکس(تبخال) در سه ماهه ابتدایی بارداری می تواند موجب بروز، میکروسفالی، زخم های پوستی، کوریوترینیت (التهاب شبکه کوروئید چشم) نوزادی گردد.

**شیردهی:**

این دارو در شیر مادر ترشح می شود. بیماران مبتلا به ویروس تبخال که جهت درمان، آسیکلوویر مصرف می کنند میتوانند تا زمان بروز زخم بر روی سینه و رعایت بهداشت کامل به شیردهی ادامه دهند.

در صورت بروز زخم های ویروسی نزدیک و یا روی سینه، توصیه می شود از شیردهی تا زمان بهبود زخم ها خودداری نمایید.

**تداخل دارویی:**

فنسافرئت، زیدووزین و تنوفویر (داروی ضد ویروس)

کلادریبین، میکوفنولات (داروهای مورد استفاده در درمان سرطان)

تیزانیدین (داروی مورد استفاده در گرفتگی عضلات)

واکسن زوستر(واکسن زوستر )از مصرف آسیکلوویر در طی ۲۴ ساعت قبل از تزریق واکسن و تا ۳ روز بعد از واکسیناسیون خودداری کنید).

واکسن زوستر (آسیکلوویر ممکن است اثرات درمانی این واکسن را کاهش دهد.)

**عوارض جانبی:**

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد ، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است:

**شایع (بیش از ۱۰ درصد):**

کاهش سطح هموگلوبین، کاهش تعداد نوتروفیل ها (سلول های محافظتی بدن)، بی حالی و ضعف

**شایع ( ۱ - ۱۰ درصد):**

کهیر، راش پوستی، خارش، کاهش تعداد پلاکت های خون، افزایش میزان بیلی روبین سرم، افزایش میزان ترانس آمینآز سرم، سردرد، افزایش میزان نیتروژن لوره خون، افزایش کراتینین سرم

**شرایط نگهداری:**

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضا آن مصرف نکنید.

**هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.**

**ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران**

**تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: دی ۱۴۰۲**

شرکت داروسازی
خوارزمی
آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلالی
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۵۷۷۵۶۵۲۱ تلفن: ۷-۲۱۰۲۰۲۰۲۰
info@kharazmipharm.com www.kharazmipharm.com