و قرص باز شونده در دهان

انستین® ۴

اندانسترون

هر قرص از این دارو، حاوی ۴ میلی گرم اندانسترون می باشد که در بلیستر های ۱۰ عددی و جعبه های ۱۰۰ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصـــرف آن در موارد مشـــابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

*وجود هر گونه حساسیت *بارداری و یا شیردهی

*استفاده از سایر داروها *ابتلا به بیماری های دیگر

دسته دارویی: ضد تهوع

مکانیسم اثر:

این دارو آنتاگونیست گیرنده های سروتونین می باشد. اندانسترون می تواند مانع ترشح سروتونین شده و بروز تهوع و استفراغ را در بیماران کاهش دهد.

موارد و مقدار مصرف:

-پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی:

میزان مصرف دارو بر اساس شرایط بیمار توسط پزشک تعیین می شود.

-در رژیم های شیمی درمانی همراه با ریسک بالای بروز تهوع و استفراغ:

بزرگسالان: در روز شیمی درمانی۲۴ میلی گرم ۳۰ دقیقه قبل از شروع درمان

-در رژیم های شیمی درمانی همراه با ریسک متوسط بروز تهوع و استفراغ:

بزرگسالان: ۸ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۲-۱ روز بعد از شیمی درمانی

کودکان ۱۲-۴ سال: ۴ میلی گرم ۳۰ دقیقه قبل از شروع شیمی درمانی، سپس ۴ و ۸ ساعت

پس از اولین دوز. درمان می تواند به صورت هر ۸ ساعت به مدت۲-۱ روز بعد از شیمی درمانی ادامه یابد.

-پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از پرتو درمانی:

بزرگسالان: ۸ میلی گرم ۲-۱ ساعت قبل از رادیوتراپی

-پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل:

بزرگسالان: ۱۶ میلی گرم ۱ ساعت قبل از مصرف دارو های بیهوشی

نحوه مصرف:

در خصوص مقدار مصرف دارو، با پزشک خود مشورت نمایید. بیش از میزان توصیه شده توسط پزشک، مصرف نکنید.

در صورتی که در طول ۱ ساعت بعد از مصـرف دارو، دچار استفراغ شدید، توصیه می شود مجدداً دارو را استفاده نمایید.

تا قبل از زمان مصـرف، دارو را از بلیسـتر خود خارج نکنید. قرص را روی زبان قرار دهید تا باز شود سپس آن را میل نمایید. نیازی به مصرف مایعات همراه با این دارو نیست.

این دارو را ۳۰ دقیقه قبل از شیمی درمانی، ۲-۱ ساعت قبل از رادیو تراپی و ۶۰-۳۰ دقیقه قبل از جراحی و القاء بیهوشی استفاده کنید.

در صورتی که مصـرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، ولی احسـاس تهوع و بیماری نمی کنید، دوز بعدی را در صورت نیاز مصرف نمایید.

در صورتی که مصرف یک دوز از داروی خود را فراموش کرده اید و احساس تهوع و استفراغ می کنید، دوز مورد نظر را هرچه سریع تر مصرف کنید.

موارد منع مصرف:

-در صورت حساسیت به اندانسترون

-در صورت مصـرف همزمان با داروی آپو مورفین: مصـرف همزمان این دو دارو می تواند باعث بروز کاهش فشار خون و از دست دادن هوشیاری در بیماران گردد.

هشدار ها:

-دوره مصرف دارو را بر طبق نظر پزشک ادامه دهید و دارو را خودسرانه قطع نکنید.

-در صورتی که تهوع و استفراغ شما با مصرف دارو بهبود نیافت، با پزشک خود مشورت نمایید.

-از مصرف این دارو در ۳ ماه اول بارداری بدون تجویز پزشک متخصص خودداری نمایید.

احتیاطات مصرف:

در صورت بروز هر یک از موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

-در صورت بروز سردرد های شدید به دنبال مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

-بروز سندرم سروتونین همراه با این دارو گزارش شده است. بروز این عارضه خصـــوصا در زمان مصـــرف اندانسترون با دارو هایی مانند دارو های مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین، دارو های SNRI، دارو های مهار کننده مونو آمین اکسیداز، میرتازاپین، لیتیوم، فنتانیل، ترامادول و متیلن بلو می تواند رخ دهد. علائم سندرم سروتونین شامل موارد ذیل می باشد:

احسـاس پریشـانی و آشفتگی، توهم، کما، افزایش ضربان قلب، فشـار خون ناپایدار، تعریق، سرگیجه، افزایش دمای بدن، گرگرفتگی، لرزش و ناهماهنگی حرکات بدن. در صورت بروز این علائم دارو را قطع کرده و سـریعا به پزشک مراجعه نمایید.

ATW.309/LF.0

Orally Disintegrating Tablet

Onestin® 4

Ondansetron

-در صورت داشتن بیماری کبدی قبل از مصـــرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید. در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی، تنظیم دوز دارو توسط پزشک صورت می گیرد.

-در بیماران دارای نارسایی خفیف تا متوسط کبدی، این دارو باید با احتیاط مصرف شود.

-در صورت داشتن سابقه بروز واکنش های حســـــاسیتی با این دارو و یا سایر دارو های ضد تهوع مانند گرانیسترون

-در صورت وجود انسداد گوارشی

-در صورت داشتن مشکلات قلبی-عروقی مانند نارسایی قلبی و یا سندرم QT طولانی مادرزادی

بارداری و شیردهی:

این دارو می تواند از جفت عبور یابد، در دوران بارداری و شیردهی مصـــرف این دارو منوط به تجویز پزشک و بررسی وضعیت بیمار می باشد.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن اســـت نحوه عملکرد دارو های شـــما را تغییر دهد و یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصـــولاتی که استفاده می کنید (از جمله دارو های بدون نســـخه و محصـــولات گیاهی) را تهیه کرده و آن را با پزشک و یا داروساز خود به اشتراک بگذارید.بدون تائید پزشک، مصرف دارو ها را شروع، متوقف و یا تغییر ندهید.

-دارو هایی که در درمان آریتمی قلبی مورد استفاده قرار میگیرند مانند آمیودارون

-داروهایی که ریتم قلبی را دچار اختلال می کنند.

-دارو های آنتی سایکوتیک مانند پیموزاید و هالوپریدول

-دارو های ضد افسردگی مانند مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین

-دارو های آنتی بیوتیک من جمله: کینولون ها و ریفامپین

-دارو های مورد استفاده در درمان عفونت های قارچی مانند کتوکونازول، ایتراکونازول

-ضد درد های مخدر مانند ترامادول

-سایر دارو های مورد استفاده در درمان تهوع و استفراغ

-دارو های ضد سرطان مانند میتوتان، دابرافنیب، انزالوتامید

-دارو های دیورتیک (ادرار آور)

-علف چای

-داروهای القاء کننده آنزیم سایتوکروم 3A4 مانند دارو های مورد استفاده در درمان تشنج مانند فنی توئین، کاربامازپین

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواســـته ای نیز گردد ، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشـــد پزشـــک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است.

-در صورت بروز علائم زیر، دارو را قطع کرده و سریعا به پزشک مراجعه کنید:

احســـاس سختی و خس خس در قفســـه سینه، افزایش ضربان قلب، تورم پلک، تورم صورت و لب ها، بروز واکنش های پوستی من جمله راش و کهیر

عوارض خیلی شایع(بیش از ۱۰ درصد):

بیوست، خستگی، سردرد، بی حالی و ضعف

عوارض شایع (۱۰-۱ درصد):

درد قفســـــه سینه، افزایش ضربان قلب، خارش و راش پوستی، کاهش سطوح پتاسیم خون(هایپو کالمی)، اسهال، بیماری های مربوط به زنان، احتباس ادراری، افزایش سطوح الانین آمینو ترانســـفراز وآسپارتات آمینو ترانسفراز،احساس پریشانی و اضطراب، برونکو اسپاسم و هایپوکسی

عوارض نادر (کمتر از ۱ درصد):

کاهش فشار خون، عوارض اکستراپیرامیدال (از جمله علائمی چون انقباض عضلات گردن، ناتوانی در بی حرکت ماندن، ناتوانی در شروع حرکت و یا کندی حرکات، لرزش، سفتی عضلات و حرکات چهشی)

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

حتما جعبه دارو را نزد خود داشته باشید و به پزشک نشان دهید و او را آگاه سازید.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضا آن مصرف نکنید.

دارو را تا زمان مصرف از بسته بندی خارج نکنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سـوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر ۱۴۰۳

شرکت داروسازی خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال، بن بست داروسازی خـوارزمی، پـلاک ۱۱۵

کدپـستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲ تلفن: ۱۷-۴۴۵۴۵۴۱۳-۰۲۱

www.kharazmipharm.com info@kharazmipharm.com