

از اولین دوز برای ۲-۱ روز بعد از کامل شدن رادیوتراپی تجویز شود.
اگر فرکشن روزانه به شکم داده شود: ۸ میلی گرم خوراکی، ۲-۱ ساعت قبل
از رادیوتراپی، با فاصله زمانی هر ۸ ساعت بعد از اولین دوز برای هر روز
رادیوتراپی تجویز شود.

-تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی:

بزرگسالان: ۱۶ میلی گرم خوراکی، ۱ ساعت قبل از القا بیهوشی.

راهنمایی های عمومی:

-این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در
موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

-این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان
از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود
مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به اندانسترون یا هر یک از اجزای
دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت مصرف همزمان با آپومورفین در مورد مصرف این دارو با پزشک
خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

اندانسترون در دوران بارداری در صورت نیاز و زیر نظر پزشک می تواند
مصرف شود.

اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در دوران شیردهی وجود ندارد پس با
احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها:

-در افراد با مقادیر غیر طبیعی الکترولیت ها، حین درمان با اندانسترون،
مانیتورینگ ECG صورت گیرد. همچنین در افراد با نارسایی احتقانی قلب،

هر قرص روکش دار خط دار انستین® حاوی ۴ میلی گرم اندانسترون (به
صورت هیدروکلراید) می باشد که در پلیستری های ۱۰ عددی و در جعبه های
۱۰۰ عددی همراه با برگه راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید، اما مقدار مصرف معمول این
دارو به شرح ذیل است:

-پیشگیری از تهوع و استفراغ مرتبط با داروهای شیمی

درمانی سرطان با تهوع بالا:

بزرگسالان: ۲۴ میلی گرم خوراکی، ۳۰ دقیقه قبل از شروع شیمی درمانی در
یک روز.

-پیشگیری از تهوع و استفراغ مرتبط با داروهای شیمی

درمانی سرطان با تهوع متوسط:

بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا: ۸ میلی گرم خوراکی، دو بار در روز.
دوز اول باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع شیمی درمانی، تجویز شود و با یک
فاصله ۸ ساعته از اولین دوز، دوز بعدی مصرف شود. سپس ۸ میلی گرم دو بار
در روز (هر ۱۲ ساعت) برای ۲-۱ روز بعد از اتمام شیمی درمانی تجویز شود.
کودکان ۱۱-۴ سال: ۴ میلی گرم خوراکی ۳ بار در روز، دوز اول باید ۳۰
دقیقه قبل از شروع شیمی درمانی تجویز شود و دوزهای بعدی با فاصله
زمانی هر ۸-۴ ساعت بعد از اولین دوز داده شود. سپس ۴ میلی گرم خوراکی
۳ بار در روز (هر ۸ ساعت) برای ۲-۱ روز بعد از اتمام شیمی درمانی داده شود.

-پیشگیری از تهوع و استفراغ مرتبط با رادیوتراپی:

بزرگسالان: دوز معمول: ۸ میلی گرم خوراکی ۳ بار در روز.
اگر کل بدن رادیوتراپی شود: ۸ میلی گرم خوراکی، ۲-۱ ساعت قبل از هر
فرکشن رادیوتراپی در هر روز.

اگر یک فرکشن (single fraction) با دوز بالا به شکم داده شود: ۸
میلی گرم ۲-۱ ساعت قبل از رادیوتراپی که با فاصله زمانی هر ۸ ساعت بعد

کاهش ریتم قلب، مصرف همزمان با داروهایی که فاصله QT قلب را زیاد می کنند نیز مانیتورینگ ECG صورت پذیرد.
بعد از تجویز اندانسترون سطح پتاسیم و منیزیم سرم را بررسی نمایید.
از مصرف این دارو در ۳ ماه اول بارداری بدون تجویز پزشک متخصص خودداری نمایید.

موارد احتیاط:

اندانسترون در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:
در صورت مصرف همزمان اندانسترون با سایر داروهای سروتونرژیک مثل MAOIs، SNRIs، SSRIs، میرتازاپین، فنتانیل، لیتیم، ترامادول، متیلن بلو، زیرا احتمال ایجاد سندرم سروتونین وجود دارد.
در بیماران با سابقه طولانی بودن فاصله QT قلب.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
دیزوپیرامید، پروکائین آمید، کینیدین، سوتالول، کلرپرومازین، سییتالوپرام، کلاریترومایسین، اریترومایسین، فلوکستین، لووفلوکساسین، موکسی فلوکساسین، پیموزاید، تیوریدازین، زیراسیدون، آپومورفین، آریپیپرازول، بوستان، دفراسیروکس، ایواپردین، گیاه علف چای، ترامادول.

نحوه صحیح مصرف دارو:

اندانسترون را می توان همراه یا بدون غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:
سردرد، اسهال، سرگیجه، خستگی، بیوست، کاهش یا افزایش ضربان قلب،

کاهش فشار خون، اضطراب، بی قراری، خواب آلودگی، احتباس ادرار، کاهش اکسیژن، کهیر، تب، سندرم اکستراپیرامیدال (نادر)، افزایش سطح ALT و AST سرم، راش پوستی، آنافیلاکسی، برونکواسپاسم، تغییر در ECG، تشنج تونیک-کلونیک.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اسفند ۱۴۰۲