قرص روکشدار

جاریبت®

امپاگلیفلوزین

F.C. Tablet

JARIBET®

EMPAGLIFLOZIN

قرص خوراکی روکشـــدار جاریبت®، حاوی ۱۰ و ۲۵ میلی گرم امپاگلیفلوزین می باشد که در شرکت داروسازی خوارزمی، تولید و در بلیســترهای ۱۰ عددی بســته بندی شده و داخل یک جعبه به همراه متن راهنما به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشـابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید :

– وجود هر گونه حساسیت – بارداری و یا شیردهی

– استفاده از سایر داروها – ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو :

قرص امپاگلیفلوزین از دسته داروهای مهارکننده باز جذب گلوکز – سدیم به شمار می رود که از طریق مهار باز جذب گلوکز در کلیه باعث کاهش قند خون می شود. مقدار مصـــرف این دارو بسته به شرایط بیماری و بیمار تجویز می گردد.

کنترل قند خون

امپاگلیفلوزین در دیابت نوع ۲ برای کنتـرل قند خون در کنار ورزش و رژیم غذایـی به کار مـی رود.

مقدار و نحوه ی مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهایی که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

دارو را در ساعات مشـــخص و در هنگام صبح همراه یا بدون غذا و با یک لیوان آب مصـــرف نمایید.

درصورتی که یک نوبت از مصـــرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصـرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصـرف نموده و از دوبرابر کردن مقدار دارو خودداری کنید..

بزرگسالان(۸۴–۱۸ سال): ۱۰ میلی گرم یک بار در روز

مصرف دارو تا ۲۵ میلی گرم روزانه قابل افزایش است.

بزرگسالان (۸۴ سال به بالا): توصیه نمی شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود حساسیت به امپاگلیفلوزین یا هر یک از مواد تشکیل دهنده آن

نارسایی شدید کلیوی

بیماران تحت دیالیز

دیابت نوع ۱

کتواسیدوزیس دیابتی(افزایش کتون ها در خون یا ادرار)

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری : با توجه به اثرات سمی در مطالعات بر روی حیوانات ، مصـــرف این دارو در دوران بارداری به ویژه سه ماهه دوم و سوم توصیه نمی شود.

شیردهی: با توجه به مطالعات بر روی حیوانات در خصـــوص امکان ترشح این دارو در شیر ، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

در زمان شروع درمان از عدم کاهش حجم مایع خارج سلولی که به دلیل مصرف مدرها، اسهال شدید و نارسایی شدید کلیه بوجود می آید اطمینان حاصـل شـود و در صـورت بروز آن در طول درمان مصرف دارو قطع شود.

از مصرف الکل به مقدار زیاد در طول درمان خودداری نمایید.

در زمان تغییر وضعیت ناگهانی از حالت نشســته به ایســتاده با توجه به امکان بروز سرگیجه احتیاط نمایید.

از قطع مصرف دارو یا تغییر در میزان تجویز دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک خود افزایش ندهید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، سریعا به بیمارستان مراجعه کنید.

در بیمارانی که به منظور انجام جراحی های مهم و یا به واسطه داشتن بیماری های حاد و جدی در بیمارستان بسـتری شده اند، قطع درمان با این دارو تا زمان پایدار شدن وضعیت بیمار الزامی می باشد.

موارد احتیاط :

در صورت ابتلا به بیماری های ذیل قبل از مصرف پزشک معالج خود را مطلع نمایید :

بیماری قلبی– عروقی ، عفونت های مجاری ادراری ، درمان با داروهای کاهش دهنده فشـار خون، کودکان زیر ۱۸ سال و بیماران بالای ۷۵ سال ، سابقه افت فشـــار خون ، بیماری های گوارشی، استفاده از دیورتیک ها (داروهای مدر)، نارسـایی کبدی و کلیوی، کتواسـیدوزیس ، افت قند خون به دلیل مصـرف همزمان با انسـولین و سایر فراورده های مشـابه، عفونت های دستگاه تناسلی، بالا بودن LDL خون

این دارو ممکن اسـت سـبب گیجی در برخی افراد شـود. لذا ضـمن درمان، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شـما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولاتی که استفاده می کنید(از جمله داروهای بدون نسـخه و محصـولات گیاهی) نگه دارید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصـــرف داروها را شروع، متوقف یا تغییر ندهید.

دیورتیکها، انســـــــولین یا داروهای کاهنده قند خون، آملودیپین، آسپرین، دایاگلیفلوزین،کاناگلیفلوزین، متفورمین، سیتاگلیپتین، لوتیروکسین، لوزارتان.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضـــی عوارض ناخواسته نیز شود.

اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروسـاز خود مشورت نمایید:

کتواســـیدوز (افزایش کتون ها در خون و ادرار)، عفونت های مجاری ادراری ، افت قند خون (هیپوگلایسـمی) ، مشـکلات کلیوی و دهیدراسیون، واکنشـهای شدید آلرژیک، عفونت در دستگاه تناسلی

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشـــورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر ۱۴۰۵

شرکت داروسازی خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال، بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵

کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲ تلفن: ۱۷-۴۴۵۴۵۴۱۳-۰۲۱

www.kharazmipharm.com info@kharazmipharm.com

ATW.182/LF.02