



از مصرف الکل به مقدار زیاد در طول درمان خودداری نمایید.
در زمان تغییر وضعیت ناگهانی از حالت نشسته به ایستاده یا توجه به امکان بروز سر گیجه احتیاط نمایید.

از قطع مصرف دارو یا تغییر در میزان تجویز دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.
مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک خود افزایش ندهید.
در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، سریعا به بیمارستان مراجعه کنید.
در بیمارانی که به منظور انجام جراحی های مهم و یا به واسطه افت فشارهای حاد و جدی در بیمارستان بستری شده اند، قطع درمان با این دارو تا زمان پایدار شدن وضعیت بیمار الزامی می باشد.

موارد احتیاط:

در صورت ابتلا به بیماری های ذیل قبل از مصرف پزشک معالج خود را مطلع نماید:
بیماری قلبی - عروقی، عفونت های مجاری ادراری، درمان با داروهای کاهش دهنده فشار خون، کودکان زیر ۱۸ سال و بیماران بالای ۷۵ سال، سابقه افت فشار خون، بیماری های گوارشی، استفاده از دیورتیک ها (داروهای مدر)، نارسایی کبدی و کلیوی، کتواسیدوزیس، افت قند خون به دلیل مصرف همزمان با انسولین و سایر فرآورده های مشابه، عفونت های دستگاه تناسلی، بالا بودن LDL خون
این دارو ممکن است سبب گیجی در برخی افراد شود. لذا ضمن درمان، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی نگه دارید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع، متوقف یا تغییر ندهید.

دیورتیکها، انسولین یا داروهای کاهش قند خون، آمولدیین، اسپرین، داپاگلیفلوزین، کانالیگلیفلوزین، متفورمین، سیانگلیپتین، لووتیروکسین، لوزارتان.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود.

اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کتواسیدوز (افزایش کتون ها در خون و ادرار)، عفونت های مجاری ادراری، افت قند خون (هیپوگلاسمی)، مشکلات کلیوی و هیدراتاسیون، واکنشهای شدید آلرژیک، عفونت در دستگاه تناسلی

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امتحان آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۲

قرص خوراکی روکشدار جاریبت®، حاوی ۱۰ و ۲۵ میلی گرم امپاگلیفلوزین می باشد که در شرکت داروسازی خوارزمی، تولید و در پلیسترهای ۱۰ عددی بسته بندی شده و داخل یک جعبه به همراه متن راهنما به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری شکر قند خون تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

قرص امپاگلیفلوزین از دسته داروهای مهارکننده باز جذب گلوکز - سدیم به شمار می رود که از طریق مهار باز جذب گلوکز در کلیه باعث کاهش قند خون می شود. مقدار مصرف این دارو بسته به شرایط بیماری و بیمار تجویز می گردد.

کنترل قند خون

امپاگلیفلوزین در دیابت نوع ۲ برای کنترل قند خون در کنار ورزش و رژیم غذایی به کار می رود.

مقدار و نحوه ی مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهای که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

دارو را در ساعات مشخص و در هنگام صبح همراه با بدون غذا و یا یک لیوان آب مصرف نمایید.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دوبار کردن مقدار دارو خودداری کنید.

بزرگسالان (۸۴-۱۸ سال): ۱۰ میلی گرم یک بار در روز
مصرف دارو تا ۲۵ میلی گرم روزانه قابل افزایش است.
بزرگسالان (۸۴ سال به بالا): توصیه نمی شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود حساسیت به امپاگلیفلوزین یا هر یک از مواد تشکیل دهنده آن

نارسایی شدید کلیوی

بیماران تحت دیالیز

دیابت نوع ۱

کتواسیدوزیس دیابتی (افزایش کتون ها در خون یا ادرار)

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: با توجه به اثرات سمی در مطالعات بر روی حیوانات، مصرف این دارو در دوران بارداری بویژه سه ماهه دوم و سوم توصیه نمی شود.

شیردهی: با توجه به مطالعات بر روی حیوانات در خصوص امکان ترشح این دارو در شیر، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها:

در زمان شروع درمان از عدم کاهش حجم مایع خارج سلولی که به دلیل مصرف مدرها، اسهال شدید و نارسایی شدید کلیه بوجود می آید احتیاط حاصل شود و در صورت بروز آن در طول درمان مصرف دارو قطع شود.