

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موزات اثر درمانی می تواند موجب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشاوهه نمایید.

احساس طعم تلخ در دهان پس از مصرف دارو و تهوع ناشی از آن، تحریک و سوزش داخل بینی، عطسه، خواب آلودگی، گیجی، سردرد، خشکی دهان

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

پس از هر بار مصرف، درپوش ظرف را در جای خود قرار دهید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

از قراردادن دارو در یخچال خودداری شود. هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

دی ۱۴۰۱

شرکت داروسازی
خوارزمی

برای مصرف آماده نمایید. درپوش اسپری را بردارید و چند مرتبه دارو را در هوا اسپری نمایید تا زمانی که مطمئن شوید دارو از اسپری به درستی و به راحتی خارج می گردد.

جهت استفاده از اسپری لازم است در حال نشسته و یا ایستاده قرار بگیرید. نوک اسپری را داخل سوراخ بینی قرار داده و سر را به جلو خم کنید. سوراخ دیگر بینی را با انگشت خود بپنیدید. همزمان با اسپری کردن دارو از طریق بینی نفس بکشید.

از اسپری کردن مستقیم دارو به دیواره داخل بینی، دهان و چشم خودداری نمایید.

پس از هر بار اسپری، نوک اسپری را بوسیله دستمال کاغذی تمیز نمایید. سپس درپوش اسپری را بر روی آن قرار دهید.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به آزلاستین هیدروکلراید و یا سایر اجزای تشکیل دهنده، قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورتیکه در دوران بارداری و شیردهی هستید و یا تصمیم به باردار شدن دارید، قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

هشدار و احتیاط:

مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا در طول درمان از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید. از تماس مستقیم دارو با دهان و چشم خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی مطالعه نشده است.

اسپری بینی آزلاستین، حاوی ۱۲۵ میکروگرم آزلاستین (به صورت ملح هیدروکلراید) در هر دوز (پاف) می باشد، که همراه با راهنمای مصرف دارو، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می گردد.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه یا عدم توانایی خواندن مطالب

مقدار و موارد مصرف دارو:

مقدار و مورد مصرف هر دارو را پزشک با توجه به شرایط هر بیمار تعیین می نماید. اما مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

– آبریزش بینی ناشی از آلرژی فصلی و یا آلرژی دائمی در بیماران بزرگسال و کودکان بزرگتر از ۶ سال

– بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۶ سال: ۱ پاف در هر سوراخ بینی دو بار در روز (صبح و عصر) اسپری شود. (مجموع دوز روزانه ۵۰۰ میکروگرم)

نحوه مصرف دارو:

بینی خود را پیش از استفاده تمیز نمایید. زمانی که برای اولین بار از این دارو استفاده می نمایید، لازم است ابتدا ظرف دارو را