

هر بیمانه (۵ میلی لیتر) از شریت برینیل® حاوی ۱۵ میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید و ۵ میلی گرم سدیم ساخارین (به عنوان شیرین کننده) می باشد که در جمیع های یک عددی همراه با بیمانه و بر برگ راهنمای مصرف در عر شه می شود.

موارد و مقدار مصرف:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ضد سرفه
درمان موقتی سرفه های بدون خلط ناشی از سرماخوردگی یا محرک های استنشاقی:

کودکان ۴-۶ سال: ۵ میلی گرم (۱/۵ میلی لیتر) هر ۴ ساعت در صورت نیاز مصرف شود. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۲۰ میلی گرم.

کودکان ۱۲-۶ سال: ۱۰ میلی گرم (۲ میلی لیتر) هر ۴ ساعت در صورت نیاز مصرف شود. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳۰ میلی گرم.

کودکان ۱۲ سال به بالا: ۲۰ میلی گرم (۶/۵ میلی لیتر) هر ۴ ساعت در صورت نیاز مصرف شود. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱۲۰ میلی گرم.

بزرگسالان: ۲۰ میلی گرم (۶/۵ میلی لیتر) هر ۴ ساعت در صورت نیاز مصرف شود. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱۲۰ میلی گرم.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.
- در صورت مصرف این دارو، اگر از ۷ روز علائم سرفه بهبود نیافت و یا در صورت وجود تب، راش پوستی یا سردرد مداوم با پزشک خود مشورت نمایید.
- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۴ سال خودداری نماید. مگر زیر نظر پزشک معالج.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:
- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دکسترومتورفان یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- این دارو، در صورت مصرف داروهای مهار کننده MAO (ترانسیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید، فنلنرین) با فاصله زمانی کمتر از ۱۴ روز مصرف نشود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط و فقط زیر نظر پزشک صورت می پذیرد.

هشدارها:
- مصرف همزمان این دارو با داروهای MAO می تواند باعث بروز عوارضی مثل: سرگیجه، هيجان، افزایش فشار خون، افزایش دمای بدن، خونریزی داخل جمجمه، اسهال، لرش بدن و رفتارهای سایکوتیک (افزایش فعالیت، توهم بینایی و شنوایی) گردد. در صورت بروز این علائم سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.
- اگر دچار سرفه های مزمن ناشی از سیگار، آسم، برنوشیت مزمن و آمفیژم ریوی هستید و یا سرفه ها همواره با مقدار خلط همراه است، از مصرف این دارو بدون مشورت و تجویز پزشک معالج بپرهیزید.

موارد احتیاط:

- این دارو در افراد با اختلال عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شود.

- این دارو در کودکان با سندرم اتوپیک (کودکانی با یک یا تعداد بیشتری از این علائم: اگزما، رینیت آلرژیک، آسم آلرژیک) با احتیاط مصرف شود.

- از مصرف ریبی و رویه و بیش از حد مجاز روزانه این دارو خودداری کنید، زیرا سوء استفاده یا مصرف نادرست این دارو می تواند باعث مرگ، آسیب مغزی، تشنج، کاهش سطح هوشیاری و ضربان قلب نامنظم شود.

- مصرف همزمان این دارو با داروهای SSRIs (فلوکستین، پاروکستین) به جز فلوکسامین، حتی تا چند هفته بعد از قطع مصرف این داروها، تداخل وجود دارد.

- این دارو ممکن است در تست های آزمایشگاهی ادراری اپیوئیدها و هروئین تداخل ایجاد کرده و باعث جواب مثبت کاذب شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
آرپیپیرازول، دایوکسستین، دارونابور، ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید، فنلنرین، متانتین، متیلان بلو، متوکلوپرامید، پگ اینترفرون آلفا 2b، کینیدین، فلوکستین، پاروکستین، آمبودون، ترامادول.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک

فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

گیجی خفیف، تحریک پذیری، هيجان، عصبی شدن، بیوست، سردرد، خواب آلودگی خفیف، تهوع و استفراغ، درد شکمی، آرام شدن تنفس (در دوزهای بالا).

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم زیر دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه مراجعه نمایید:

آتاکسی (بی نظمی حرکات عضلات چشم، تکلم، اندام ها یا راه رفتن)، تاری دید، کما، گیجی، خواب آلودگی یا سرگیجه، در برسیون تنفسی (آرام شدن تنفس)، تهوع و استفراغ شدید، هيجان شدید غیر معمول، عصبی شدن، بی قراری یا تحریک پذیری، احتباس ادرار.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و در جای خشک نگهداری و از نور و ریح زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- دارو را در دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاسلااب یا زاله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ای امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۳۹۷