

BELATRON® 50 Sumatriptan

بلاترون® ۵۰ سوماتریتپتان

۵۰ تا ۵۰ میلی گرم در روز میباید در اختلالات کبیدی مزمن از مصرف این دارو اجتناب شود. در اختلالات کبیدی دارو با احتیاط مصرف شود.

در بیماران با سابقه حساسیت به سولفونامیدها با احتیاط مصرف شود.

۷- موارد احتیاط مراقبت بیمار:

خواب آلودگی ممکن است فعالیت هایی مانند رانندگی که نیاز به مهارت دارند را تحت تاثیر قرار دهد.

۸- تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان این دارو با ارگوتامین خودداری کنید ارگوتامین را حداقل ۲۴ ساعت قبل یا ۶ ساعت بعد از سوماتریتپتان مصرف کنید.

از مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده آنزیم مونو آمین اکسیداز و تا ۱۴ روز پس از قطع مصرف این داروها خودداری کنید.

۹- عوارض جانبی دارو:

رایج یا بسیار رایج: سرگیجه، خواب آلودگی، تنگی نفس، خستگی، گرگرفتگی، درد عضلانی، حالت تهوع، اختلالات حسی، افزایش موقتی فشار خون، استفراغ، ضعف.

۱۰- شرایط نگهداری:

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۴۰۲

هر قرص حاوی ۵۰ میلی گرم ماده موثره دارویی می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

• وجود هر گونه حساسیت

• بارداری و یا شیردهی

• ابتلا به بیماری های دیگر

• اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد مصرف دارو:

درمان میگرن حاد

۳- نحوه مصرف:

بزرگسالان: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در مرحله اول سپس اگر بیش از ۲ ساعت از مصرف دوز نخست گذشته باشد در صورت نیاز ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در مرحله دوم در صورت ادامه سردرد (حداکثر دوز مصرفی مجاز روزانه ۳۰۰ میلی گرم میباشد)

۴- موارد منع مصرف:

در بیماران با وازواسپاسم عروق کرونری، حملات قلبی ایسکمیک، فشار خون متوسط کنترل نشده، فشار خون بالا، بیماری عروق محیطی، سابقه مشکلات عروق مغزی، سابقه انفارکتوس میوکارد، سابقه سکنه مغزی، آنژین پرنیتال این دارو نباید استفاده شود.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در زمان بارداری ممنوع است مگر در زمانی که پزشک فواید دارو را بر مضرات آن برتر بداند

در زمان شیردهی تریج این دارو در شیر بسیار ناچیز است اما لازم است پس از مصرف دارو تا ۱۲ ساعت از شیر دادن خودداری شود.

۶- هشدارها:

در شرایطی که فرد مسن تعد ابتلا به بیماریهای عروق کرونری میباشد، در افراد سالخورده، در افراد با سابقه تشنج، سابقه وجود مشکلات قلبی، بیماری فشار خون کنترل شده، افراد با ریسک فاکتور تشنج با احتیاط مصرف شود. در اختلالات کبیدی دوز مصرفی