

Double Scored Tablet Biperiden 2

در صورت بروز علائم گرامزدگی مانند کاهش تعریق، گیجی و حالت تهوع دارو را قطع و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

۷- موارد احتیاط:

در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

– افراد مبتلا به اختلالات تیروئیدی

– افراد مسن

– آقایان مبتلا به بزرگی پروستات

– افراد با سابقه صرع و تشنج

– بیماران با سابقه نارسایی قلبی و یا نامنظمی ضربانات قلبی

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید: ضدافسردگی های سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین، داروهای درمان اختلالات حرکتی مانند لوودوبا/کربی دوپا، داروهای درمان بیماری های اعصاب و روان، داروهای شل کننده عضلانی، آنتی هیستامین ها، پئیدین، متوکلوپرامید، کینیدین

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

واکنشهای حساسیتی، سرگیجه، کاهش هوشیاری، خستگی و خواب آلودگی، بی قراری، اضطراب، تغییر الگوی خواب، اختلالات حافظه، توهم، مشکلات گوارشی مانند حالت تهوع، یبوست، کاهش تعریق، خشکی دهان، افزایش ضربان قلب، سرخوشی، سردرد، حساسیت به نور، مشکل در تکلم، افزایش فشار داخل چشمی، دیسکینزی، التهاب غدد بزاقی

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

– دارو را از بسته بندی اصلی خود خارج نکنید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفظ محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران – ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اسفند ۱۴۰۲

قرص خط دار متقاطع

بی پریدن ۲

بی پریدن ۲، قرص خوراکی خط دار متقاطع است که حاوی ۲ میلی گرم بی پریدن می باشد. این دارو در بلیسترهای ۱۰ عددی در جعبه های ۱۰۰ عددی (۱۰ بلیستر در هر جعبه) به همراه بروشور، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت

* بارداری و یا شیردهی

* ابتلا به بیماری های دیگر

* اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

– در صورت فراموشی یک نوبت از داروی بی پریدن، نوبت بعدی را در زمان همیشگی آن استفاده کرده و از دو برابر کردن دوز خودداری نمایید.

– قطع مصرف این دارو باید تدریجی و با نظر پزشک معالج انجام شود.

موارد و مقدار مصرف دارو:

پهچود علائم پارکینسون: ۲ میلی گرم ۳ الی ۴ نوبت در روز. حداکثر دوز روزانه ۱۶ میلی گرم است.

کاهش عوارض اکستراپیرامیدال ناشی از برخی داروها: ۲ میلی گرم ۱ الی ۳ نوبت در روز

نحوه مصرف:

به منظور کاهش عوارض گوارشی، بهترین زمان مصرف داروی بی پریدن بعد از غذا می باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر قبل از مصرف داروی بی پریدن با پزشک خود مشورت کنید:

– سابقه آلرژی به داروی بی پریدن یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این قرص

– ابتلا به کلوکوم یا زایوه بسته

– مشکلات گوارشی از قبیل انسداد روده

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط با صلاحدید پزشک معالج امکان پذیر است.

هشدارها:

بی پریدن می تواند موجب خواب آلودگی شما شود. حین مصرف این دارو از رانندگی، کار با ماشین آلات و سایر کارهایی که نیازمند دقت و هوشیاری شما هستند، خودداری نمایید.

در صورت بروز علائم آلرژی از جمله کهیر، تاول، قرمزی پوست، تورم صورت، تنگی نفس دارو را قطع و سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید.

در صورت بروز مشکل در دفع ادرار به خصوص در افراد مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات) دارو را قطع و سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید.