

بودزوناید

۱۰۰ میکروگرم

اسپری بینی بودزوناید حاوی ۱۰۰ میکروگرم بودزوناید در هر دوز (پاف) می باشد که، به همراه متن راهنمای مندرج داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا پزشک اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار و مورد مصرف هر دارو را پزشک با توجه به شرایط هر بیمار تعیین می کند. اما مصرف معمول این اسپری به شرح ذیل است:

پیش گیری و درمان رینیت آلرژیک و واژومور

بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۱۲ سال سن: ۲ پاف در هر سوراخ بینی یک بار در روز ترجیحا صبح ها یا ۱ پاف در هر سوراخ بینی دو بار در روز (مجموعاً دوز روزانه ۴۰۰ میکروگرم) بعد از کنترل علائم دوز به یک پاف در هر سوراخ بینی یک بار در روز کاهش می یابد.

پولیپ بینی

بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۱۲ سال سن: ۱ پاف در هر سوراخ بینی دو بار در روز به مدت سه ماه

نحوه مصرف:

قبل از مصرف ظرف حاوی دارو را چند مرتبه تکان دهید.

بینی خود را پیش از استفاده تمیز کنید. زمانی که برای اولین بار از این دارو استفاده می کنید، باید ابتدا بطری را برای مصرف آماده کنید. بدین منظور چند مرتبه دارو را در هوا اسپری کنید تا زمانی که مطمئن شوید دارو از اسپری به درستی خارج می شود.

جهت استفاده از اسپری باید در حالت نشسته یا ایستاده قرار بگیرید. نوک اسپری را داخل سوراخ بینی خود قرار داده، سر را کمی به جلو خم کنید. سوراخ دیگر بینی را با دست خود

Rhinoriz®

NASAL Spray
Budesonide
100 mcg

– اسپری دسموپرین
– سابقه افزایش فشار داخل چشمی، گلوکوم و کاتاراکت
– ابتلا به اختلال عملکرد کبدی
– مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و یا ابتلا به بیماریهای نقص سیستم ایمنی
– ابتلا به سیستمیک فیبروزیس

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها به خصوص داروهای زیر پزشک معالج خود را در جریان بگذارد:

– داروهای که برای درمان بیماری ایذر تجویز می شوند مانند ریتوناویر
– داروهای مهار کننده قوی آنزیم سائیتوکروم ۳A۴ مانند کتوکنازول، کاربوترامین، ایتراکونازول، نفازودون)
– داروی سریتیبپ

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی می تواند موجب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه ممکن است این عوارض در یک فرد دیده نشود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
خشکی گلو، سرفه، برونکواسپاسم، تحریک مخاط بینی، گلودرد، افزایش فشار داخل چشمی، کاهش حس بویایی و چشایی، تیش قلب

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به حالت ایستاده، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

پس از هر بار مصرف درپوش اسپری را در جای خود قرار دهید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی،

تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۴۰۳

شرکت داروسازی

خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید باهنر، جلال، پ. ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۲-۱۷
کد پستی: ۱۳۸۲۷۵۱۲
www.kharazmi-pharm.com
info@kharazmi-pharm.com

پیوشاید. همزمان با اسپری کردن دارو از طریق بینی نفس بکشید.

– از اسپری کردن مستقیم دارو به دیواره داخل بینی، دهان و چشم خودداری کنید.

بعد از هر مرتبه استفاده از اسپری آن را به وسیله دستمال کاغذی تمیز نمایید.

پس از استفاده درپوش اسپری را بر روی آن قرار دهید.

موارد منع مصرف:

– در صورت وجود حساسیت به بودزوناید یا سایر اجزای تشکیل دهنده قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورتی که در دوران بارداری یا شیردهی هستید و یا تصمیم به باردار شدن دارید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها:

در صورت بروز علائم شدید حساسیت به دارو مانند تورم صورت، مشکل در بلع، کپهر، مشکل تنفسی دارو را قطع و سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

تجویز طولانی مدت و یا دوز بالا در کودکان می تواند موجب کاهش سرعت رشد در آنها شود. به همین علت کودکانی که از این دارو استفاده می کنند باید به طور مرتب از لحاظ سرعت رشد پایش شوند.

قطع این دارو باید به صورت تدریجی و تحت نظر پزشک انجام شود.

در صورتی که این دارو را به مدت چندین ماه استفاده می کنید برای ادامه مصرف با پزشک معالج خود صحبت کنید.

در صورتی که به تازگی عمل جراحی بینی انجام داده اید و یا اخیراً خونریزی از بینی و یا ضربه به بینی داشته اید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورتی که مبتلا به سسل ریوی فعال یا نهفته، عفونت هریس چشمی، و سایر عفونت های قارچی، باکتریایی و ویروسی درمان نشده هستید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

افرادی که دارو را برای مدت طولانی مصرف می کنند و یا طی مصرف دچار تغییراتی در بینایی می شوند باید تحت معاینات چشم پزشکی قرار گیرند.

موارد احتیاط:

قبل از مصرف این دارو وجود هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید: