

بودزوناید

۶۴ میکروگرم

Rhinoriz®
NASAL Spray
Budesonide
64 mcg

اسپری بینی بودزوناید حاوی ۶۴ میکروگرم بودزوناید در هر دوز (پاف) می باشد که، به همراه متن راهنمای مندرج داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

ایمنی و اثر بخشی مصرف این دارو برای کودکان کمتر از ۶ سال به اثبات نرسیده است.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار و مود مصرف هر دارو را پزشک با توجه به شرایط هر بیمار تعیین می کند. اما مصرف معمول این اسپری به شرح ذیل است:
رینیت آلرژیک (فصلی یا دائمی)، پولپ بینی بزرگسالان: ۲ پاف در هر سوراخ بینی یک مرتبه در روز اسپری شود.

کودکان ۶ تا ۱۷ سال: ۲ پاف در هر سوراخ بینی یک بار در روز

بعد از کنترل علائم دوز را کاهش دهید.

نحوه مصرف:

قبل از مصرف ظرف حاوی دارو را چند مرتبه تکان دهید.

بینی خود را پیش از استفاده تمیز کنید. زمانی که برای اولین بار از این دارو استفاده می کنید، باید ابتدا بطری را برای مصرف آماده کنید. بدین منظور چند بگرمته دارو را در هوا اسپری کنید تا زمانی که مطمئن شوید دارو از اسپری به درستی خارج می شود.

جهت استفاده از اسپری باید در حالت نشسته یا ایستاده قرار بگیرید. نوک اسپری را داخل سوراخ بینی قرار داده، سر را کمی به جلو خم کنید. سوراخ دیگر بینی را با دست خود بپوشانید. همزمان با اسپری کردن دارو از طریق بینی نفس بکشید.

از اسپری کردن مستقیم دارو به دیواره داخل بینی، دهان و چشم خودداری کنید.

بعد از هر مرتبه استفاده از اسپری آن را به وسیله دستمال کاغذی تمیز نمایید.
پس از استفاده درپوش اسپری را بر روی آن قرار دهید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود حساسیت به بودزوناید یا سایر اجزای تشکیل دهنده قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورتی که در دوران بارداری یا شیردهی هستید و یا تصمیم به بارداری شدن دارید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها:

در صورت بروز علائم شدید حساسیت به دارو مانند تورم صورت، مشکل در بلع، کفیر، مشکل تنفسی، دارو را قطع و سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

تجویز طولانی مدت و با دوز بالا در کودکان می تواند موجب کاهش سرعت رشد در آنها شود. به همین علت کودکانی که از این دارو استفاده می کنند باید به طور مرتب از لحاظ سرعت رشد پایش شوند.

قطع این دارو باید به صورت تدریجی و تحت نظر پزشک انجام شود.

در صورتی که این دارو را به مدت چندین ماه استفاده می کنید برای ادامه مصرف با پزشک معالج خود صحبت کنید.

در صورتی که به تازگی عمل جراحی بینی انجام داده اید و یا اخیراً خونریزی از بینی و یا ضربه به بینی داشته اید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورتی که مبتلا به سسل ریوی فعال یا نهفت، عفونت هریس چشمی، و سایر عفونت های قارچی، باکتریایی یا ویروسی درمان نشده هستید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

افراد ده اید و یا دارو را برای مدت طولانی مصرف می کنند و یا طی مصرف دچار تغییراتی در بینایی می شوند باید تحت معاینات چشمی پزشکی قرار گیرند.

موارد احتیاط:

قبل از مصرف این دارو وجود هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:
- سابقه افزایش فشار داخل چشمی، گلوکوم و

کاتاراکت
- ابتلا به اختلال عملکرد کبدی
- مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و یا ابتلا به بیماریهای نقص سیستم ایمنی
- ابتلا به میستیک فیبروزیس
تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها به خصوص داروهای زیر پزشک معالج خود را در جریان بگذارید:

- اسپری دسموپرسین
- کورتیکواستروئیدهای خوراکی یا تزریقی (مانند دگزامتازون، پردنیزولون)
- داروهایی که برای درمان بیماری ایذر تجویز می شوند مانند ریتوناویر
- داروهای مهار کننده قوی آنزیم سایتوکروم ۲۴ مانند گتوکانازول، کلارینتروماپسین، ایتراکانازول، نفازولدون)
- داروی سرتینیب

عوارض جانبی دارو:

دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی می تواند موجب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
خشکی گلو، سرفه، برنکواسپاسم، تحریک مخاط بینی، گلودرد، افزایش فشار داخل چشمی، کاهش حس بویایی و چشایی، تپش قلب

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد به حالت ایستاده، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

پس از هر بار مصرف درپوش اسپری را در جای خود قرار دهید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین وبسایتی: مهر ۹۹

شرکت داروسازی
خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال، پلاک ۱۱۵
پست: داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کد پستی: ۱۳۸۷۹۵۱۲
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۱۲۷
www.kharazmipharm.com
info@kharazmipharm.com