

این دارو به صورت قرص های روکشدار خط دار حاوی ۵۰۰ میلی گرم ماده موثره کلاریترومایسین توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نماید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر گونه حساسیت به کلاریترومایسین، اریترومایسین و یا سایر ماکرولیدها.

- وجود هر نوع حساسیت به موارد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگها.

- در صورت حاملگی و شیردهی.

- در صورت مصرف سایر داروها بخصوص کاربامازپین دیگوکسین، ریفامپین - ریفامپین،

تئوفیلین، وارفارین و زیدوودین.

- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر اختلال عملکرد کلیوی شدید.

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

عفونت مجاری تنفسی از جمله عفونت و التهاب گوش میانی ، عفونت های پوستی

- کودکان (۱۷-۱۲ سال)

۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۷ الی ۱۴ روز که در صورت نیاز و در عفونت های شدید مکرر (پنومونی) به میزان ۱۰۰۰ میلی گرم یک بار در روز افزایش می یابد.

- بزرگسالان:

۲۵۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۷ الی ۱۴ روز ، که در صورت نیاز و در عفونت های شدید مکرر (پنومونی) به میزان ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد.

بیماری لایم:

- کودکان (۱۷-۱۲ سال):

۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۷ الی ۲۱ روز

- بزرگسالان:

۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۱۴ الی ۲۱ روز

پیشگیری سیاه سرفه:

- کودکان (۱۷-۱۲ سال):

۵۰۰ میلی گرم دوبار در روز به مدت ۷ روز

- بزرگسالان:

۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۷ روز

از بین بردن عفونت هلیکوباکتر پیلوری:

- بزرگسالان:

۲۵۰ الی ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز

۳- نحوه مصرف:

در صورت فراموش نمودن مصرف یک دوز، دارو را به محض به یاد آوردن مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف دو روز بعدی رسیده است فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر نمودن مقدار دارو در نوبت بعدی خودداری کنید.

۴- موارد منع مصرف:

- در بیماران مبتلا به زردی کلسیاتیک و یا نارسایی کبدی ناشی از مصرف کلاریترومایسین

- در حساسیت مفرط به کلاریترومایسین، اریترومایسین و سایر ماکرولیدها

- در بیماران تحت درمان با پیموزاید، سیموآستاتین، سبزاپراید، پیموزاید یا سایر داروهای افزایش دهنده فواصل QT و ایجاد کننده آریتمی

- در مصرف همزمان با کلشی سین در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی - کلیوی.

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی گردد، مگر در موارد اضطراری و به راهنمایی پزشک متخصص.

۶- هشدارها:

در صورت مشاهده موارد ذیل از ادامه مصرف دارو خودداری نمایید:

- در صورت وجود حساسیت مفرط به فراورده

- طولانی شدن فواصل QT

- کاهش شدید ضربان قلب

۷- موارد احتیاط:

- در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی - کلیوی با احتیاط مصرف شود.

- در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی - عروقی با احتیاط مصرف شود.

۸- تداخلات دارویی:

کلشی سین، داروهای کاهش دهنده کلسترول (استاتین ها) مانند: سیموآستاتین، پیموزاید، سبزاپراید، دیگوکسین، کلوزاپین، کاربامازپین، سیکلوسپورین، والپروات، وراپامیل، وارفارین، تئوفیلین، وراپامیل ،رتفانیدین، زیدوودین

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

عفونت، واکنشهای حساسیتی، سمیت و اختلالات کبدی ، گلویت پسودومیرمان، ترومبوسیتوپنی، اختلالات شخصیتی و ذهنی، طولانی شدن زمان QT در ریتم قلبی، سندرم استوئوس جاسونوس، توهم زایی، لکوپنی، نارسایی کبدی، کاهش قند خون، سرگیجه، تهوع، استفراغ، بی اشتها، یوزوز گوش و کاهش شنوایی از عوارض نادر و غیر شایع این دارو می باشد.

عوارضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

تغییرات حس چشایی، سوء هاضمه، نفخ، اختلالات دستگاه گوارشی (تهوع)، استفراغ، اسهال، درد معده و سردرد.

۱۰- مسمومیت

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

۱۱- شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اسفند ۱۳۹۷



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، کلوتهر ۷ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال
فابیان پلاک ۱۱۵ صندوق پستی، ۱۳۸۹۷۱۵۶۳
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۳۱۷
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com