

Topical ointment Clobetasol 0.05 %

هشدار ها و احتیاطات مصرف:

در صورت مورد دارو دخیل، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:
در صورت داشتن سابقه حساسیت به پماد استروئید ها
در صورت وجود عفونت مزمن
در صورتی که برای آبرای صریح پزشکی از بدن استفاده می نمائید.
در صورتی که این دارو را در اجزای حساس پدید و چین پوست استفاده می نمائید.
این دارو باستانی خدگر مورد رور برای کودکان و رور پوست صورت (به دلیل تراک بر بودن پوست در این قسمت) استفاده گردد.
از استعمال رور در ناحیه در چشم و داخل چشم خوداری نمائید استفاده از این دارو به صورت مکرر در ناحیه اطراف چشم میباید ریسک ابتلا به گلکاتاکت و گلوکوم را افزایش دهد.
بیشتر از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
در صورتی که بعد از استفاده از این دارو به مدت ۲-۴ هفته، بهبودی حاصل نشد، با پزشک خود مشورت نمائید.
در صورتی که بعد از مصرف این دارو، علائمتان بدتر و در ناحیه مورد استفاده رور و تورم ایجاد شد، دارو را قطع کرده و با پزشک خود تماس حاصل فرمائید.
بلون تجویز پزشک از پاشمان کردن موضع اجتناب نمائید.
میزان مصرف دارو به عواملی از جمله پایه مورد استفاده برای دارو، مدت زمان تماس دارو با پوست، سطح تماس و وضعیت پوست بیمار بستگی دارد برای کاهش جذب سبستمیک دارو بهتر است این دارو در نواحی تیره بازه زمانی و کوچک ترین موضع استعمال گردد.
کورکتیو استروئیدها، موضعی در صورت جذب سبستمیک می توانند باعث سرکوب محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال (HPA)، تعاطرات سندرم کویتشک، افزایش قد خون و گلوکوز یا وجود گلر در ادرار) در برخی از بیماران گردد.
موردی که می توانند جذب سبستمیک کورکتیو استروئید ها را افزایش دهند شامل: استفاده از استروئید های قوی، استفاده در مناطق وسیعی از بدن، استفاده طولانی مدت و استفاده از پاشمان در موضع می باشند.
مصرف طولانی مدت کورکتیو استروئید ها می تواند باعث رور عفونت قوایی، پنهان کردن عفونت حاد باشد عفونت های قارچی و تشدید عفونت های ویروسی گردد.
مصرف طولانی مدت کورکتیو استروئید ها در بعضی بیماران همراه با ابتلا به کایوس مارکوب محور هیپوتالاموس به پات پدید می آید، بوده است، در صورت بروز این مشکل، درون را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمائید.

تداخلات دارویی:

در صورتی که در طول درمان با کورتیزول موضعی می باشید در صورت مصرف دارو های زیر با پزشک خود مشورت نمائید.
رتینوئیدها، ایزوتترتینوئید و ایدلوسیکون (از مصرف همزمان این دارو با کورتیکواستروئید ها پرهیز کنید)

عوارض جانبی:

هر رور به میزان اثرات مطلوب درمانی می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای زیر گردد. اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. عوارض جانبی پوستی عبارتند از: خارش، تحریک، خشکی، عفونت قوایی، پنهان کردن عفونت حاد، التهاب، عفونت قوایی (مو) و واکنش آلرژیک. عوارض جانبی سیستمیک عبارتند از: افزایش قند خون و گلوکوز یا وجود گلر در ادرار) در برخی از بیماران. عوارض جانبی سیستمیک ناشی از مصرف طولانی مدت این دارو شامل: محور هیپوتالاموس هیپوفیز، افزایش قند خون و وجود قند در ادرار می باشند.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.
دارو را خارج از برداجال نگهداری و از ریخ زنج محافظت نمائید.
دارو را از دسترس کودکان نگهداری کنید.
دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضای از مصرف نکنید.
هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی رور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه رور اداختن این سوال کنید. از اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک رزای می کند.
ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آذر ۱۴۰۰

هر پماد ۱۵ گرمی، حاوی ۵۰ میلی گرم کورتیزول پروپیوات در ۱۰۰ گرم پماد می باشد که به همراه متن راهنمای محصول توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خوداری نمائید.
قبل از مصرف دارو دخیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.
درودر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی - ابتلا به بیماری های دیگر

استفاده از سایر رورها
حساسیت دارویی:
کورتیزول در کورتیکو استروئید ها می باشد و داشتن اثرات ضد التهابی، ضد خارش و متفخی کندگی عروق قش، خود را ایفا می کند.
کورتیکو استروئید ها:

کورتیکو استروئید ها با اثر بر روی لکوستید ها (سلول های محافظتی بدن) از ایجاد التهاب (دورم)، ترشح هیستامین، تولید کمیلان های التهابی و خارش جلوگیری می نمایند.
این دارو به کاهش تولید، کاهش و فعالیت فاکتور های شیمیایی التهابی از جمله کیتین ها، هیستامین، پروستاگلندین ها و ... کمک می کند.

مورد مصرف دارو:
کورتیزول در کمک به کاهش قرمزی و خارش پوست در بیماری های چون:

اکزما
درماتیت (التهاب پوستی) و سایر شرایط پوستی که به کورتیکواستروئید های ضعیف تر پاسخ نداده اند
سموزیدزیسی (بیماری پوستی پوستی خود ایمنی)
اوسریتازول
لکین پلان (یک بیماری پوستی است که باعث خارش، برجستگی های سطح به رنگ بنفش مایل به قرمز در قسمت، بازوها یا پائین پا می گردد)
کاربرد دارو:

نحوه و مقدار مصرف:
این دارو را در رور روی ناحیه مورد مطالعه و مالید و به آرامی مالش دهید.
تعداد دفعات دقیق مصرف و از پزشک یا داروساز خود سوال نمائید. مصرف معمول این دارو ۲-۳ بار در روز می باشد.
در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محضی که یاد آورین آن را مصرف نمائید، ولی اگر زمان مصرف غلطی را فراموش کرده باشید، از مصرف بیشتر آن خوداری کنید.

مقدار منع مصرف:
در صورت حساسیت به کورتیزول، سایر کورتیکواستروئید ها و یا سایر ترکیبات به رور که در این دارو کودکان زیر ۱۲ سال
در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، مصرف کورتیزول باعث پدتر شدن وضعیت فعلی فرد می گردد:
- آگه و وگلاریس
- سرخ شدن شدید پوست در بینی و اطراف آن (روزانه)
- بثورات قرمز لکه در اطراف دهان
- عفونت پوستی با منشأ باکتریایی، قارچی، ویروسی و انگلی (تنها در صورت همراهی دارو های ضد عفونت، مصرف کورتیزول می باشد)
- خارش های پوستی که به دلیل التهاب ایجاد نشده باشند
- خارش در اطراف مقعد و ناحیه رتینال
- در صورت وجود علائم سیستمی مرتبط با بیماری های توریکولریز و سفلیس
- جوش و خارش به دنبال واکنش هیستامین

بارداری و شیردهی:
مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی منوط به تجویز پزشک می باشد.
در دوران شیردهی بهتر است از کورتیکواستروئید های ضعیف تر برای مادران استفاده گردد. هم چنین استفاده از کورتیکواستروئید ها در ناحیه اطراف سینه برای مادران توصیه نموده نمی گردد.