

این قرص آورده به شکل قرص روکشدار ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم می باشد که در بسته بندی ۳۰ عددی (قوطی و بلیستر)، همراه با پرگه راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

**راهنمای عمومی:**  
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توسط به دیگران خودداری نمایید. در صورتیکه پاسخ تمامی سؤالات شما در این برگه راهنما نیامده است، می توانید به پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.  
قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

- \* وجود هر گونه حساسیت
- \* بارداری و یا شیردهی
- \* استفاده از سایر داروها
- \* ابتلا به بیماری های دیگر

**دسته دارویی:**  
آنتی تئوپلاستیک (ضد سرطان)

**مکانیسم اثر:**  
این دارو یک داروی ضد سرطان است و با مهار پروتئین های تیروزین کیناز، از رشد و گسترش سلول های سرطانی جلوگیری می نماید.

**موارد مصرف دارو:**  
این دارو در سرطان های شرح داده شده در ذیل و برای بزرگسالان کاربرد دارد.

سرطان به سه سئول غیر کوچک(NSCLC): این دارو جهت درمان موارد پیشرفته سرطان به غیر سئول کوچک به عنوان خط اول درمان، یا به خط بعدی درمان در صورت شکست رژیم های شیمی درمانی قبلی تجویز می شود.

سرطان پانکراس: این دارو هم چنین در رژیم ترکیبی به همراه داروی جمیتابین جهت کنترل سرطان پانکراس متاستاتیک با پیشرفته کاربرد دارد.

**این دارو ممکن است در درمان سایر بیماری های که در اینجا به آنها اشاره نشده است نیز به کار رود.**

**مقدار مصرف:**  
ارلوکو® به عنوان یک داروی تخصصی، حتما باید تحت نظر پزشک متخصص تجویز گردد. مقدار دوز مصرفی، بر اساس شرایط بیمار و نوع بیماری توسط پزشک تعیین می شود.

**سرطان به سه سئول غیر کوچک(NSCLC):**  
۱۵۰ میلی گرم یک بار در روز

**سرطان پانکراس:**  
۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز

**نحوه مصرف:**  
قرص اارلوکو® را حداقل یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا، همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.

از مصرف این دارو با گریب قوت و یا آب گریب قوت خودداری کنید.

این دارو را دقیقا همان طور که پزشک تجویز نموده است مصرف کنید در صورتی که از چگونگی مصرف دارو مطمئن نیستید یا پزشک خود تماس حاصل فرمایید.

دارو را بدون مشورت با پزشک خود قطع نکنید.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یادآوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

در صورت مصرف مقادیر بسیار زیاد این دارو، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید. در چنین شرایطی، ممکن است عوارض جانبی دارو افزایش یابد و پزشک مجبور به قطع درمان گردد.

**موارد منع مصرف:**  
در صورت حساسیت به ایلوتینیب و یا سایر ترکیبات به کار رفته در این دارو

## احتیاطات مصرف:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر، قبل از مصرف دارو، پزشک خود را مطلع سازید:

مشکلات کبدی یا کلیوی

در صورت سابقه ابتلا به زخم های گوارشی و یا بیماری دیورتیکولیت

استعمال سیگار

مصرف داروهای که باعث افزایش و یا کاهش سطح سرمی ایلوتینیب می شوند و پزشک شما ممکن است دوز ایلوتینیب را یا در نظر گرفتن مصرف آنها، تنظیم کند. تعدادی از این داروها عبارتند از: داروهای ضد قارح مانند، کوکونازول، مهار کننده های پروتئاز، اریتروماسین، کلاریترومایسین، فنی توئین، کاربامازپین، باربیتورات ها، ریفاکسیمین، سیپروفلوکساسین، امیزارول، غلغ جای

مصرف داروهای ضد انعقاد خون

مصرف داروهای کنترل کننده کلسترول خون از دسته استاتین ها مانند آتورواستاتین

سابقه مشکلات چشمی نظیر خشکی چشم ها، زخم قرنیه و استفاده از لنزهای تماسی

در حین مصرف داروی اارلوکو® بروز هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

مشکل ناگهانی در تنفس همراه با تب یا سرفه

اسهال- (در صورتی که اسهال شدید و همراه با علائم تهوع، استفراغ و بی اشتها باشد باید سریعاً پزشک خود را مطلع سازید)

خرد شدید شکمی، کپهر و ضایعات شدید پوستی

خرد و قرمز شدن چشم ها، افزایش ترشحات چشمی، تاری دید، حساسیت به نور ( نور از هر یک از این موارد را سریعاً به پزشک معالج خود اطلاع دهید).

خرد و ضعف عضلانی

ایمنی و اثر بخشی مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، اثبات نشده است.

**بارداری و شیردهی:**

در حین درمان با ایلوتینیب از بارداری خودداری کنید و از روش های پیشگیری از بارداری در طول درمان استفاده کنید. در صورتی که برای داشتن فرزند برنامه ریزی کرده اید، قبل از شروع مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در طول دوره درمان و حداقل ۲ هفته بعد از مصرف آخرین دوز دارو، از روش های جلوگیری از بارداری استفاده نمایید.

اگر حین درمان با این دارو باردار شدید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید تا وی در مورد ادامه درمان تصمیم گیرد.

از شیر دادن به فرزند خود در طول دوره درمان و حداقل تا دو هفته پس از مصرف آخرین دوز دارو، اجتناب کنید.

**تداخلات دارویی:**

در صورتی که از دارو های زیر استفاده می کنید و یا اخیراً استفاده کرده اید و یا امکان دارد این دارو ها را شروع کنید، با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

دارو های مهار کننده CYP3A4 از جمله: کوکونازول، کلاریترومایسین، ایتراکانازول، نافازونول، ریکونازول، سیپروفلوکساسین

دارو های القا کننده CYP3A4 از جمله: کاربامازپین، فنی توئین، ریفاکسیمین، فنپرازپیتال، غلغ جای داروهای که PH معده تأثیر دارند از جمله: فاموتیدین و امیزارول

دارو های ضد انعقاد خون از جمله: وارفارین

سایر تداخلات دارویی به شرح زیر می باشد:

کبستاین، کربوپلاتین

**عوارض جانبی:**

هر دارو به موارد اثبات مطلوب درمانی، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده

است.

در صورت مشاهده هر یک از عوارض زیر، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید. پزشک ممکن است دوز داروی شما را کاهش دهد یا آن را قطع کند.

اسهال- از استفراغ شدید اسهال شدید و مداوم می تواند موجب کاهش سطح خونی تاسیم شده و منجر به آسیب کلیوی گردد.

سرور التهابات چشمی، کتونیوت و رتایت چشمی

سرور: نفس ناگهانی همراه با سرفه یا تب: که ممکن است علائم بروز بیماری ریوی پنیومونی (IDL) باشد.

خرد شدید شکمی: که می تواند علامت سوراخ شکمی مجرای گوارشی باشد.

تعبیرات تدریجی در آزمایشات عملکرد کبدی: که ممکن است نشان دهنده ناراسی کلی باشد.

**سایر عوارض این دارو عبارتند از:**

**عوارض خیلی شایع:**

راش پوستی، کاهش اشتها و کاهش وزن، افسردگی، سردرد، بی حسی دست و پا، تهوع، زخم های دهانی، مشکلات گوارشی از جمله نفخ و سوءهاضمه، خشکی و خارش پوست، ریزش مو، احساس خستگی

**عوارض شایع:**

خونریزی از بینی، خونریزی دستگاه گوارشی، عفونت فلوکلول مو، آکنه، اختلالات کلیوی

**عوارض غیر شایع:**

رشد غیر طبیعی سینه ها، ناخن های خشک و شکننده، افزایش رشد موهای صورت و بدن یا الگوی مردانه

**عوارض نادر:**

گرم شدن و درناک شدن دست ها و پا

**عوارض خیلی نادر:**

زخم و سوراخ شدن قرنیه

**گزارش عوارض احتمالی:**

در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی با پزشک، داروساز یا پرستار خود در مورد آن صحبت نمایید. این شامل هر عارضه جانبی می شود که در این بروشور نیامده است.

شما می توانید عوارض جانبی را به طور مستقیم در سایت شرکت که آدرس آن در زیر همین بروشور نوشته شده است، گزارش نمایید.

گزارش دادن عوارض جانبی توسط شما، می تواند به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد ایمنی این دارو کمک زیادی نماید.

**مسئومیت:**

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

حتما همه دارو را نزد خود داشته باشید و به پزشک نشان دهید و او را آگاه سازید.

**شرایط نگهداری:**

دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از تابش مستقیم آفتاب و داخل بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضا آن مصرف نکنید.

**هیچ دارویی را به طریق قافضاً یا زباله های خانگی دور نریزید.**

**از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید.** این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آذر ۱۴۰۳