

هر ۱۰ میلی لیتر محلول خوراکی، حاوی ۳۰۰۰ میلی گرم ال کارنیتین می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود: راهنمای عمومی:

این فرآورده برای شما تجویز شده است، لذا از توصیه به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف:

کمک به متابولیسم چربی

مقدار مصرف:

دوز مصرفی بر اساس میزان پاسخ دهی بدن فرد توسط پزشک تنظیم می گردد. اما مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل می باشد:

بزرگسالان: روزانه یک عدد ویال خوراکی و یا طبق نظر پزشک مصرف نمائید.

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

این فرآورده را می توان به تنهایی یا به صورت حل شده در نوشیدنی مثل آب میوه و یا غذای مایع مصرف نمود.

این فرآورده برای کمک به انجام بهتر تمرینات ورزشی و بهبود عملکرد بدنی بهتر است ۴-۲ ساعت قبل از ورزش مصرف گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده در دوران شیردهی و بارداری باید طبق نظر پزشک صورت گیرد.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض

ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم زیر سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید.

عوارض جانبی این محصول به ندرت دیده می شود از جمله عوارض گوارشی مانند حالت تهوع، استفراغ، درد شکم، سوزش معده، اسهال، نفخ شکم و همچنین می تواند ادرار، عرق و نفس دارای بوی ماهی باشد. برخی از عوارض جانبی دیگر عبارتند از: نقرس، واکنش آلرژیک یا التهاب مجاری هوایی و تشنج.

با کاهش دوز، تقسیم دوز به دوزهای کمتر یا حل کردن آن در مایعات، می توان عوارض گوارشی را کاهش داد.

هشدارها و موارد احتیاط:

در صورت وجود موارد زیر، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمائید:

وجود هرگونه حساسیت به ال کارنیتین یا هر یک از اجزای سازنده این فرآورده در بیماران یا سابقه مشکلات نارسایی کلیوی، تشنج و کم کاری تیروئید و بیمارهای کبدی این محصول میبایست با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف گردد.

در صورت داشتن سابقه مشکلات کلیوی یا دیالیز

در صورت داشتن دیابت و استفاده از انسولین و یا سایر داروهای مورد استفاده در دیابت

در صورتی که بر روی رژیم غذایی با کالری کاهش یافته می باشید

در صورت عدم تحمل به قند

تداخلات دارویی:

این فرآورده با داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین دارای تداخل می باشد.

شرایط نگهداری:

فرآورده را درون جعبه، در جای خشک، دور از نور مستقیم، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید

توصیه می شود پس از هر بار مصرف محتویات هر عدد بطری را مصرف کرده و از نگهداری باقیمانده محلول خودداری نمائید.

پس از هر بار مصرف در ظرف را محکم ببندید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۴۰۱



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۳ - ۱۳۸۹۷۱۶۵۱۲ کدپستی:
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com