

سوسپانسیون خوراکی فکسوفنادین

هر ۵ میلی لیتر حاوی ۳۰ میلی گرم ماده موثره دارویی می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی
* استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی
تسکین علائم کپهر

مقدار مصرف:

رینیت آلرژیک فصلی:

کودکان ۱۲-۲ سال: ۳۰ میلی گرم (۵ میلی لیتر) هر ۱۲ ساعت (حداکثر میزان مجاز مصرف روزانه: ۶۰ میلی گرم)

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۶۰ میلی گرم (۱۰ میلی لیتر) هر ۱۲ ساعت (حداکثر میزان مجاز مصرف روزانه: ۱۲۰ میلی گرم)

کپهر:

کودکان ۱۱-۶ سال: ۳۰ میلی گرم (۵ میلی لیتر) هر ۱۲ ساعت

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۶۰ میلی گرم (۱۰ میلی لیتر) هر ۱۲ ساعت

موارد منع مصرف:

دارای منع مصرف در بیماران با سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده محصول می باشد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها:

در صورت بروز عوارض آلرژیک همراه با فکسوفنادین، دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

بیماران کلیوی قبل از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایند.

موارد احتیاط:

به بیماران توصیه می شود که سوسپانسیون فکسوفنادین را فقط در صورت تجویز پزشک مصرف کنند. بیشتر از مقدار توصیه شده، مصرف نگردد. اگر در هنگام مصرف سوسپانسیون عوارض ناخواسته ای به وجود آمده، مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک خود مشورت کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف موارد ذیل، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

کنوکونازول یا اریترومايسين منجر به افزایش غلظت پلاسمایی فکسوفنادین میشود.

از مصرف همزمان دارو با آنتی اسیدهای حاوی

آلومینیوم و منیزیم خودداری نمائید.

داروهایی که ممکن است در حین مصرف آنها با این دارو تداخل ایجاد کنند:

داروهایی مانند اسپری بینی آزلاستین، اسپری دهانی اپیراتروپیوم، تیوتروپیوم، پتاسیم سیترات، پتاسیم کلیدینوم، آکلیدینوم، کلوزاین، متوکلوپرامید، دارو های ایپوتید، ریفامپین، رویینیرول، از مصرف دارو همراه با آمپوه خودداری نمائید.

عوارض جانبی دارو:

خیلی شایع:

سردرد و استراخ

شایع:

سرگیجه، خستگی، درد، اسهال و تهوع، سوء هاضمه، عفونت ویروسی، عفونت گوش میانی، عفونت دستگاه تنفس فوقانی، سرفه، درد عضلانی، درد کمر، تب، خواب آلودگی، آبریزش بینی

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی،

تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۱