

هر پیمانه (۵ میلی لیتری) از شربت ۶۰ میلی لیتری فلوید® حاوی ۱۰ میلی گرم سودوافدرین هیدرو کلراید و ۶۷/۰ میلی گرم کلرفنیرامین مالئات می باشد که در جعبه های یک عددی همراه متن و راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

راهنمای های عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

• وجود هر گونه حساسیت به دارو

• بارداری و یا شیردهی

• استفاده از سایر داروها

• ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ضد احتقان و آنتی هیستامین

تسکین علائم احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی و

علائم حساسیت (عطسه، خارش، آبریزش بینی و...)

کودکان ۱۲-۶ سال: ۱۵ میلی لیتر هر ۴-۶ ساعت.

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۳۰ میلی لیتر هر ۴-۳ ساعت.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به سودوافدرین، کلرفنیرامین یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت مصرف داروهای مهار کننده ی MAO (ترانایل

سیپرومین، فنلژین، ایزوکربو کسازید) و یا داروهای پارکینسون

(سلازین) در ۱۴ روز گذشته در مورد مصرف این دارو با پزشک خود

مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به بیماری های آسم، گلوکوم زاویه بسته، هیپر تروفی (بزرگ شدن) پروستات، انسداد مژانه.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود، مگر با مشورت پزشک معالج.

موارد احتیاط و هشدارها:

مصرف این دارو در کودکان زیر شش سال توصیه نمی شود، مگر زیر نظر پزشک معالج.

این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند بپرهیزید.

ممکن است در طی مصرف دارو، حساسیت به نور اتفاق بیافتد. در صورت بروز این مشکل از روش های حفاظتی (ضد آفتاب، عینک آفتابی، ...) تا زمان بهبود علائم استفاده نمایید.

در طی مصرف این دارو، از نوشیدن الکل و فرآورده های الکلی خودداری کنید.

در افراد مسن، نیاز به کاهش دوز وجود دارد.

در طی مصرف این دارو باید بیماران را از نظر بروز علائم احتباس ادرار، بهبود علائم و اثرات آنتی کولینرژیک بررسی کرد.

مصرف این دارو می تواند بر تست های حساسیتی پوستی تاثیر بگذارد. این دارو در بیماران دیابتی و بیماران با مشکلات قلبی-عروقی با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید:

ایزوکربو کسازید، فنلژین، سلازین، ترانیل سیپرومین، آمی تریپتیلین، کاربرگولین، کلومیپرامین، دزیرامین، دوکسپین، ارگوتامین، امپیرامین، مایپروپیلین، نورتریپتیلین، ترازودون، استازولامید، اپرازولام، آلومینوم

هیدرو کساید (در دوزهای بالا)، آریپیپرازول، آلاستین، پاکوفن، بلادونا، برومو کریپتین، کلردیازپوکساید، کدئین، دیفنوکسیلات، اتانول.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود

مشورت نمایید.

آریتمی، کاهش فشارخون، تپش قلب، گیجی، تشنج، سرگیجه، سردرد، خواب آلودگی، خستگی، سرخوشی، بی خوابی، لرزش بدن، ضعف بدن، بی اشتها، آگرانولوسیتوز (کاهش گرانولوسیت های

خون)، ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت های خون)، غلیظ شدن ترشحات ریه، آنمی همولیتیک.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده ی دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۱