

قرص خط دار ایزونیازید

قرص های خط دار ایزونیازید یا دوز های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم، در پلیستر ۱۰ عده‌ی و جبهه‌ی های ۱۰۰ عده‌ی همراه با متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می‌شود:

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز اطلاع رسانی نمایید.

–وجود هر گونه حساسیت به دارو یا ترکیبات سازنده آن

–بارداری و یا شیردهی

–استفاده از سایر داروها

موارد مصرف:

ایزونیازید یک داروی ضد سل است و با متوقف کردن رشد باکتری ها عمل می کند. ایزونیازید با داروهای دیگر برای درمان عفونت های فعال سل روی استفاده می شود. همچنین به تهیهی برای جلوگیری از عفونت های فعال سل خارج ریه در افرادی که ممکن است به باکتری اوده شده باشند(افرادی که تست پوستی سل مثبت دارند) استفاده می شود و برای عفونت های ویروسی (مانند سرماخوردگی معمولی، آنفولانزا) موثر نمی باشد. استفاده از هر گونه آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک در مواقع عدم نیاز به آن می تواند باعث عدم کارکرد موثر آنتی بیوتیک ها در عفونت های آینده شود.

نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهای که مصرف می نمایند، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

این دارو را با معده خالی(۴ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

برای بهترین اثر، این دارو را راس ساعت معینی مصرف نمایید.

بزرگسالان:

دوز معمول روزانه ایزونیازید ۴ تا ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است، تا حداکثر ۳۰۰ میلی گرم در روز.

دوزهای بالاتر (حداکثر ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز) ممکن است برای درمان منبذت سلی(سلی که باعث التهاب غشای مغز می شود) استفاده شود.

دوز معمول کودکان بالای سه ماه:

دوز معمول روزانه این دارو ۱۰ تا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است.

مصرف این دارو برای کودکان کمتر از ۳ ماه توصیه نمی شود.

مصرف این دارو و سایر آنتی بیوتیک ها را تا زمان کامل شدن دوره مصرف ادامه دهید، حتی اگر علائم ناپدید شوند. توقف دوز هنگام دارو یا کاهش دوز ممکن است باعث رشد باکتری ها شود. که ممکن است منجر به بازگشت عفونت و درمان عفونت دشوار تر شود.

مصرف این دارو را تا زمان تشخیص پزشک ادامه داده و از قطع ناگهانی این دارو بپرهیزید.

همچنین ممکن است پزشک شما همزمان مصرف ویتامین B6 (پیریدوکسین) را تجویز کند تا از عوارض جانبی ایزونیازید (مانند مشکلات عصبی) جلوگیری شود.

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

مشکلات جدی کبدی و پانکراتیت

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی در افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست، بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید(از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) تهیه نمایید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف دارو را شروع، متوقف یا تغییر ندهید.

استاتوئید، نیو سولفامید، ریفاکسیمین، اپا اینوس، سلیسیک اسید(از دروی دیگری که برای درمان سل استفاده می شود)، بنزودیازپین، دیازپام، لودوید، اپیوئید، اینترکولون یا کونکوتانول، داروهای درمان صرع مانند:

Scored Tablet Isoniazid

کاربامازپین، فنی توفین یا پریمیدون.

ایزونیازید ممکن است با غذاهای حاوی هیستامین یا تیرامین (مانند برخی پنیرها، گوشت پخته شده، برخی ماهی ها مانند تن ماهی تن، ماهی قرم، آل، شراب و آبجو) تداخل ایجاد کند و باعث ایجاد علائمی از جمله سردرد، تعریق، سرخ شدن پوست، ضربان قلب سریع و نامنظم، سرگیجه، احساس ضعف(دلیل فشار خون پایین) شود. در صورت تداوم یا بدتر شدن علائم، پزشک خود را مطلع کنید.

موارد احتیاط و هشدارها:

همه بیماران مصرف کننده این دارو باید آزمایش های اولیه عملکرد کبد را در فواصل منظم در طول درمان انجام دهند. اگر سطح سرمی AST، به بیش از سه برابر میزان طبیعی برسد یا با پلی رونی افزایش یابد، درمان باید قطع شود. در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کبد احتیاط های خاصی لازم است. هر گونه وخامت عملکرد کبد در این بیماران نشان دهنده توقف درمان است.

ایزونیازید نباید به بیماران که دارای عوارض جانبی شدید از جمله بیماری کبدی ناشی از دارو هستند، تجویز شود.

ایزونیازید به بیماران مبتلا به اختلالات تشنجی، دیابت، بیماریان با سابقه روان پریشی، معاد به الکل و یا اختلال در عملکرد کبد یا کلیه، باید با احتیاط تجویز گردد.

در صورت بروز علائم هیپاتیت مانند ضعف، خستگی، بی اشتها و تهوع، مصرف ایزونیازید باید فوراً قطع شود. عواملی مانند: سن بالا، جنسیت مونث، slow acetylators، سوء تغذیه، عفونت HIV، بیماری کبدی و سل خارج ریه به عنوان عوامل خطر سمیت کبدی ناشی از مصرف ایزونیازید شناخته شده اند.

به بیماران که در طول تئروپاتی یا کمپروید پیریوکسین هستند، از جمله افراد دیابتی، الکلی، دارای سوءتغذیه، اورمی، بارداری یا آلوده به ویروس HIV باید پیریوکسین تجویز شود.

مقدار توصیه شده دارو را بدون مشورت با پزشک خود قطع ندهید.

در صورت بروز بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً به بیمارستان مراجعه کنید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد.

در هنگام مصرف این دارو، تجویز مکمل پیریدوکسین به مادر شیرده و نوزاد توصیه می گردد.

عوارض جانبی:

در بسیاری از افرادی که از این دارو استفاده می کنند عوارض جانبی جدی مشاهده نشده است، ولی در صورت بروز و تداوم هر کدام از عوارض جانبی ذکر زیر:

LFT بالا، خفیف، نوروپاتی محیطی، از دست دادن اشتها، حالت تهوع یا استفراغ، درد دل، ضعف، زرد شدن سفیدی چشم، تب، سرد شدن اثر خستگی
در صورت بروز هر یک از این عوارض جانبی تا زمان اتمام دوز:
سرگیجه، تشنگی زیاد، بی حالی، آسیب پیرشونده کبدی(با افزایش سن افزایش می یابد) و هیپررفلکسی
در صورت بروز هر یک از این عوارض جانبی تا زمان اتمام دوز:
گراوئوسیتوز، کم خونی، کم خونی با پالکوپاتیک، اختلال در پالکوپاتی خون، لوپوس اریتماتوز سیستئمیک، تشنج
در صورت بروز عوارض جانبی گزارش شده:
التهاب لوزالمعده، نکروزیس سمی اپیدرمی و واکنش دارو با سندرم ایزونیازیدی (DRESS)
فورا به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده را دارویی را از طریق قاضصاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه اِمحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی: تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۴۰۰

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان غلامرضا جلال،

پلاک ۱۱۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۲۴۱۲۰۱۷

کدپستی: ۱۳۸۹۱۶۵۲

www.kharazmipharm.com

info@kharazmipharm.com

شرکت داروسازی
خوارزمی